Mead Johnson Nutrition

Produits pédiatriques

Guide des produits

Nous ouvrons la voie en matière de produits nutritionnels à usage pédiatrique à la fine pointe de la science afin d'aider à donner aux nourrissons et aux tout-petits le meilleur départ possible dans la vie.

Enfamil

Enfamil.ca/medical

Centre de renseignements aux hôpitaux: 1-800-263-1143
Service des commandes: 1-877-307-2984

Guide des produits nutritionnels à usage pédiatrique

LA MISSION DE MEAD JOHNSON

Depuis plus de 100 ans, Mead Johnson offre des préparations pour nourrissons à la fine pointe de la science et d'autres produits nutritionnels mis au point pour aider les gens à vivre en meilleure santé. Notre entreprise a été fondée par Edward Mead Johnson, dont le fils Ted présentait de graves problèmes d'alimentation et a survécu de justesse à la première enfance. L'expérience a incité Edward Mead à mettre au point des produits capables de répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons en bonne santé et de ceux ayant des besoins alimentaires particuliers. Les principes sur lesquels s'appuyait Mead Johnson à l'époque de sa fondation sont aujourd'hui encore au cœur de la vision de l'entreprise :

Notre vision est d'être le chef de file mondial en matière de produits nutritionnels pour les bébés et les enfants. Nous nous consacrons à alimenter les enfants du monde entier pour leur donner le meilleur départ possible dans la vie.

COORDONNÉES IMPORTANTES

Représentant de MJN _____

Téléphone _____

SERVICE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

1-800-263-1143
Centre de renseignements aux hôpitaux

1-877-307-2984
Service des commandes

Enfamil.ca/medical

Destiné aux professionnels de la santé canadiens seulement.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co.
Tous droits réservés.

Les renseignements contenus dans ce guide sont destinés aux professionnels de la santé. Toutes les mesures sont prises afin de s'assurer que ces renseignements sont les plus à jour et les plus exacts possible. Puisque nos produits sont sujets à des modifications, nous vous demandons de consulter l'étiquette pour obtenir les renseignements les plus exacts.

Mead Johnson Nutrition

Table des matières

PRÉMATURÉS

Fortifiant de lait maternel Enfamil® . . . 11
Supplément de lait maternel en poudre pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.

Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée Biberon Nursette® . . . 16
Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer spécialement conçue pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui ont besoin d'un apport accru en protéines.

Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal Biberon Nursette® 20
Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.

Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal Biberon Nursette® 24
Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en énergie, en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.

Enfamil A+® EnfaCare® 28
Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui sortent de l'hôpital.

NOURRISSONS

Enfamil A+® 35
Préparation initiale courante à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons nés à terme et en santé.

Enfamil A+® hypercalorique Biberon Nursette® 44

Préparation hypercalorique à base de lait de vache conçue pour les nourrissons ayant d'importants besoins en énergie ou chez lesquels il faut restreindre l'apport liquidien.

Enfamil® 48

Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé.

Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil® 53

Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé. Préparation à teneur plus faible en fer que les autres marques*, enrichie de 7,4 mg/L de fer, conformément aux recommandations des experts quant à la composition des préparations[1].

*Enfamil A+®, Enfamil® : 12,2 mg/L; Similac® avec oméga 3 et oméga 6 : 12 mg/L; Nestlé® Bon Départ®, Nestlé® Bon Départ® avec oméga 3 et oméga 6 : 10 mg/L. Données tirées des étiquettes de produits canadiens, achetés au mois de novembre 2012.

Enfamil A+ Gentlease® 59

Préparation de remplacement de premier choix à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour être facile à digérer*.

*Semblable à toutes les préparations pour nourrissons.

Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment† . 65

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et avec de l'amidon de riz pour les nourrissons qui régurgitent fréquemment ou qui ont besoin d'une préparation épaissie.

†Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.

Enfamil A+® Sans lactose 70

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons sensibles au lactose.

Enfamil A+® Soya 75
Préparation à base de soya, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons qui ont besoin d'une préparation sans lait pour des raisons sanitaires ou culturelles.

Nutramigen® A+® avec LGG® 81
Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer qui procure une alimentation adaptée aux bébés présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment aux bébés aux prises avec des coliques*.

Nutramigen® A+® 85
Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment des bébés aux prises avec des coliques*.

*Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache

PURAMINO A+® 91
Préparation hypoallergénique à base d'acides aminés libres (100%) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons et des tout-petits atteints d'une forme grave d'allergie aux protéines du lait de vache et d'allergies alimentaires multiples ou d'autres troubles nécessitant une préparation à base d'acides aminés.

PURAMINO A+® JUNIOR 95
Préparation hypoallergénique à base d'acides aminés libres (100%) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des enfants de plus de 12 mois atteints d'une forme grave d'allergie aux protéines du lait de vache et d'allergies alimentaires multiples ou d'autres troubles nécessitant une préparation à base d'acides aminés.

Pregestimil® A+® 99
Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons atteints d'un trouble de malabsorption des graisses et pouvant être sensibles aux protéines entières.

Enfamil A+® 2 105
Préparation de transition à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.

Enfamil® 2 114
Préparation de transition pour nourrissons à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.

Eau Enfamil® 120
Eau pour voie orale seulement.

Eau Glucosée à 5% Enfamil® 122
Eau glucosée à 5%. Pour voie orale seulement.

TOUT-PETITS

Enfagrow A+® 125
Supplément nutritionnel à base de lait de vache conçu pour les tout-petits âgés de 12 à 36 mois.

MÉDICALE

Portagen® 130
Préparation à base de protéines de lait avec triglycérides à chaîne moyenne (TCM) destinée aux enfants et aux adultes.

Solution orale Enfamil® Enfalyte® pour le maintien de l'équilibre électrolytique 134
Solution orale pour le maintien de l'équilibre électrolytique. Léger arôme de cerise.

MÉTABOLIQUES

Phenyl-Free® 1 . . . . . **137**
Préparation sans phénylalanine, enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie (PCU).

Phenyl-Free® 2 . . . . . **142**
Préparation en poudre sans phénylalanine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

Phenyl-Free® 2 HP **146**
Préparation en poudre riche en protéines et sans phénylalanine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

TYROS 1 . . . . . **150**
Préparation sans tyrosine ni phénylalanine et enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de tyrosinémie de type I et de type II.

TYROS 2 . . . . . **155**
Préparation en poudre sans phénylalanine ni tyrosine pour l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de troubles héréditaires du métabolisme de la tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II.

BCAD 1 . . . . . **159**
Préparation sans isoleucine, leucine ni valine et enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable.

BCAD 2 . . . . . **164**
Préparation en poudre sans isoleucine, leucine ni valine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable ou d'autres troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.

PFD 1 168
Préparation sans protéines ni acides aminés* enrichie de vitamines, de minéraux et d'acides gras essentiels avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés.

PFD 2 173
Préparation en poudre sans protéines ni acides aminés* destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) chez qui on a confirmé la présence de troubles du métabolisme des acides aminés.

VITAMINES

Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide) 178
Supplément de vitamine D
Supplément de vitamine D pour tous les nourrissons allaités nés à terme.

Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquide) 180
Supplément multivitaminique de vitamine A, D et C
Un supplément de vitamines A, D et C conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.

Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide) 182
Supplément multivitaminique
Un supplément multivitaminique conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.

Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide) 184
Sulfate de fer, solution orale, U.S.P.
Aide à prévenir une carence en fer.

Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop) 186
Sulfate de fer, solution orale, U.S.P.
Aide à prévenir une carence en fer.

ACCESSOIRES

Tétines Enfamil® et sucettes 189

Biberons 191

TABLEAUX DE DILUTION ET PRÉPARATION

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons 195

Renseignements sur les mesures des produits en poudre de Mead Johnson Nutrition 205

Dilution des préparations pour nourrissons liquides concentrées 207

Lignes directrices pour la préparation des biberons Nursette® ou de lait maternel 208

Profil acides aminés 210

Indications Casher 224

Instructions destinées au milieu hospitalier 226
pour bien préparer, conserver et utiliser les préparations pour nourrissons

Renseignements nutritionnels divers 228

Prématurés

Fortifiant de lait maternel Enfamil®

Supplément de lait maternel en poudre pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.

Ⓤ D

INDICATION

Supplément de lait maternel en poudre pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Quatre (4) sachets de fortifiant de lait maternel Enfamil®, soit la quantité habituellement ajoutée à 100 mL de lait maternel pour prématurés, offre l'apport suivant :

NUTRIMENTS

Analyse	par 4 sachets
Calories (kcal/kJ)	14/59
Protéines (g)	1,1
% du total des calories	32
Source : Isolats de protéines laitières, isolats de protéines de lactosérum hydrolysées	
Glucides (g)	<0,4
% du total des calories	6
Source : Minéraux, extraits secs de sirop de maïs, citrates, lactose	
Matières grasses (g)	1
% du total des calories	62
Source : Huile TCM (70 %), huile de soya (30 %)	
Acide linoléique (mg)	140
Acide linolénique (mg)	17
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	90 2,3
Phosphore (mg) (mmol)	50 1,61

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 4 sachets
Magnésium (mg) (mmol)	1 0,04
Fer (mg)	1,44
Zinc (mg)	0,72
Manganèse (µg)	10
Cuivre (µg)	44
Sodium (mg) (mmol)	16 0,7
Potassium (mg) (mmol)	29 0,74
Chlorure (mg) (mmol)	13 0,37
Vitamines	
Vitamine A (UI)	950
Vitamine D (UI)	150
Vitamine E (UI)	4,6
Vitamine K (mg)	0,0044
Vitamine C (mg)	12
Thiamine (mg)	0,15
Riboflavinee (mg)	0,22
Niacine (mg)	3
Acide pantothénique (mg)	0,73
Vitamine B_6 (mg)	0,115
Acide folique (mg)	0,025
Vitamine B_{12} (mg)	0,00018
Biotine (mg)	0,0027
Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/4 sachets)[1]	9,8*
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	+ 35†
Osmolarité (mOsm/L)	Non disponible

*Lorsqu'il est ajouté au lait maternel pour prématurés selon les recommandations (4 sachets/100 mL), le fortifiant de lait maternel Enfamil® augmente la charge osmotique rénale possible d'environ 9,8 mOsm/4 sachets.

†Lorsqu'il est ajouté au lait maternel pour prématurés selon les recommandations (4 sachets/100 mL), le fortifiant de lait maternel Enfamil® augmente l'osmolalité d'envrion 35 mOsm/kg d'eau.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Durée de conser-vation	N° d'article
Fortifiant de lait maternel Enfamil®	Poudre	Quatre (4) sachets 0,71g/sachet	12 mois	1173080

MODE D'EMPLOI

Le fortifiant de lait maternel Enfamil® est un supplément nutritif servant à enrichir le lait maternel humain destiné aux nourrissons prématurés.

AVERTISSEMENT : Nutritionnellement incomplet. À être utilisé sous la supervision d'un médecin.

MISE EN GARDE : Suivre attentivement les instructions suivantes, car la santé du bébé en dépend. Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé. Une mauvaise hygiène, une technique de préparation inadéquate, une dilution erronée, une utilisation inappropriée ou de mauvaises conditions de conservation peuvent entraîner des conséquences graves. Même si cette préparation en poudre est destinée à l'alimentation des nourrissons prématurés, les préparations en poudre ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être servies à des nourrissons ou à des nourrissons prématurés immunodéprimés, sauf en cas de prescription ou sous la surveillance d'un médecin.

- Suivre le protocole de l'hôpital ou les instructions du médecin pour la manipulation sécuritaire du lait maternel.
- Pour faciliter le mélange, bien agiter le lait maternel. Verser la quantité désirée dans un récipient stérile et chauffer jusqu'à l'atteinte de la température adéquate pour alimenter le nourrisson.
- Ajouter le fortifiant en poudre au lait maternel conformément au tableau suivant :

Calories supplémentaires désirées	Lait maternel	Fortifiant de lait maternel Enfamil®
2 kcal/30 mL	50 mL	1 sachet
4 kcal/30mL	25 mL	1 sachet

- Des instructions quant au nombre de calories à ajouter seront fournies par le médecin du bébé.
- **L'absence de conformité à ces instructions pourrait entraîner de graves conséquences pour les nourrissons. Une fois préparé, le lait maternel fortifié peut se gâter rapidement.**
- Servir ou couvrir immédiatement le lait maternel fortifié et le conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Agiter avant de servir.
- **Alimentation par sonde :** Une fois préparé, le lait maternel fortifié ne doit pas demeurer à la température ambiante pendant plus de 4 heures[1]. Cette consigne s'appuie sur une recommandation de l'Academy of Nutrition and Dietetics (anciennement l'American Dietetic Association) selon laquelle le lait maternel fortifié ne devrait pas demeurer à la température ambiante (25 °C/77 °F) pendant plus de 4 heures[2].
- **Alimentation au biberon :** Verser uniquement la quantité nécessaire de lait maternel fortifié dans un biberon et servir immédiatement. Ne pas utiliser le lait maternel fortifié s'il est demeuré plus de 2 heures à la température ambiante. Une fois entamé, le biberon ne doit pas être réfrigéré. Donner la portion de lait maternel fortifié pendant l'heure qui suit, sinon la jeter.
- **MISE EN GARDE :** Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

Pendant l'utilisation de ce produit :

1. Mesurer régulièrement les taux sériques de calcium, de sodium, d'azote uréique, d'albumine, etc. En cas d'élévation du taux sérique de l'un de ces éléments, réduire la quantité de fortifiant de lait maternel Enfamil® ajoutée au lait maternel. En cas de carence, un supplément pourrait être indiqué.
2. Ne pas administrer d'autres suppléments que le fortifiant de lait maternel Enfamil®, à moins que des analyses appropriées ne commandent l'administration d'un supplément donné.
3. Ne pas ajouter plus d'un sachet de fortifiant de lait maternel Enfamil® par 25 mL de lait maternel.
4. Le lait maternel prélevé au cours des 2 semaines suivant un accouchement prématuré est particulièrement riche en éléments nutritifs. L'ajout de fortifiant de lait maternel Enfamil® n'est donc généralement pas nécessaire.

Si l'alimentation du bébé inclut plus de 25 sachets par jour, il faut surveiller les signes liés à un apport excessif en Vitamines A et D.

CONSERVATION : Conserver le fortifiant de lait maternel Enfamil® en poudre à la température ambiante. Protéger du gel et de la chaleur excessive.

Utiliser avant la date apparaissant sur l'emballage.

Ni le lait maternel ni les préparations en poudre ne sont stériles.

AVERTISSEMENT : Nourrissons de poids extrêmement faible (1 kg ou moins) : On a signalé des cas d'hypercalcémie chez certains de ces nourrissons recevant uniquement du lait maternel fortifié par voie entérale.

1. Telang S, Berseth CL, Ferguson PW, *et al.* Fortifying fresh human milk with commercial powdered human milk fortifers does not affect bacterial growth during 6 hours at room temperature. *J Am Diet Assoc.* 2005;105:1567-1572. 2. Robbins ST, Meyers R, eds. *Infant Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities.* Chicago, Ill: American Dietetic Association; 2011.

Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée Biberon Nursette®

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer spécialement conçue pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui ont besoin d'un apport accru en protéines.

Ⓤ D

INDICATION

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer spécialement conçue pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui ont besoin d'un apport accru en protéines. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3). Pour utilisation en établissement seulement.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Calories (kcal/kJ)	81/340	100/420
Protéines (g)	2,8	3,5
% du total des calories	14	14
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	8,5	10,5
% du total des calories	42	42
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matières grasses (g)	4,1	5,1
% du total des calories	44	44
Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou de carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,66	0,81
Acide linolénique (g)	0,073	0,09
ARA (mg)	28	34
ADH (mg)	13,8	17

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	134 3,3	165 4,1
Phosphore (mg) (mmol)	67 2,2	83 2,7
Magnésium (mg) (mmol)	7,3 0,3	9 0,37
Fer (mg)	1,46	1,8
Zinc (mg)	1,22	1,5
Manganèse (mg)	0,0051	0,0063
Cuivre (mg)	0,097	0,12
Iode (mg)	0,02	0,025
Sodium (mg) (mmol)	47 2,0	58 2,5
Potassium (mg) (mmol)	80 2,0	98 2,5
Chlorure (mg) (mmol)	73 2,1	90 2,5
Vitamines		
Vitamine A (UI)	1020	1250
Vitamine D (UI)	195	240
Vitamine E (UI)	5,1	6,3
Vitamine K (mg)	0,0073	0,009
Vitamine C (mg)	16,2	20
Thiamine (mg)	0,162	0,2
Riboflavinee (mg)	0,24	0,3
Niacine (mg)	3,2	4
Acide pantothénique (mg)	0,97	1,2
Vitamine B_6 (mg)	0,122	0,15
Acide folique (mg)	0,032	0,04
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00025
Biotine (mg)	0,0032	0,004
Choline (mg)	16,2	20

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Inositol (mg)	36	44
Carnitine (mg)	1,95	2,4
Taurine (mg)	4,9	6
Nucléotides (mg)	3,4	4,2

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	24
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	260
Eau (g/100 mL)	88

Utiliser sous surveillance médicale. Voir l'avis sur l'emballage. L'apport en protéines ne doit pas dépasser 4,0 à 4,5 g/kg/j chez les nourrissons de 1000 g ou moins (3,6-4,1 g/100 kcal) et 3,5 à 4,0 g/kg/j chez les nourrissons de 1000 à 1800 g (3,2-3,6 g/100 kcal). Ce produit pourrait contenir jusqu'à 3,85 g de protéines/100 kcal. Produit non destiné à l'alimentation des nourrissons prématurés après l'atteinte d'un poids approximatif de 3600 g, sauf avis contraire d'un médecin.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1281250

MODE D'EMPLOI

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal Biberon Nursette®

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.

Ⓤ D

INDICATION

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Énergie (kcal/kJ)	68/280	100/420
Protéines (g)	2	3
% du total des calories	12	12
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Gluicides (g)	7,4	11
% du total des calories	44	44
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matière grasses (g)	3,4	5,1
% du total des calories	44	44
Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,55	0,81
Acide linolénique (g)	0,061	0,09
ARA (mg)	23	34
ADH (mg)	11,5	17

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	112 2,8	165 4,1
Phosphore (mg) (mmol)	56 1,81	83 2,7
Magnésium (mg) (mmol)	6,1 0,25	9 0,37
Fer (mg)	1,22	1,8
Zinc (mg)	1,01	1,5
Manganèse (mg)	0,0043	0,0063
Cuivre (mg)	0,081	0,12
Iode (mg)	0,0169	0,025
Sodium (mg) (mmol)	39 1,71	58 2,5
Potassium (mg) (mmol)	66 1,7	98 2,5
Chlorure (mg) (mmol)	61 1,71	90 2,5
Vitamines		
Vitamine A (UI)	850	1250
Vitamine D (UI)	162	240
Vitamine E (UI)	4,3	6,3
Vitamine K (mg)	0,0054	0,008
Vitamine C (mg)	13,5	20
Thiamine (mg)	0,135	0,2
Riboflavinee (mg)	0,2	0,3
Niacine (mg)	2,7	4
Acide pantothénique (mg)	0,81	1,2
Vitamine B_6 (mg)	0,101	0,15
Acide folique (mg)	0,027	0,04
Vitamine B_{12} (mg)	0,00017	0,00025
Biotine (mg)	0,0027	0,004
Choline (mg)	13,5	20

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Inositol (mg)	30	44
Carnitine (mg)	1,62	2,4
Taurine (mg)	4,1	6
Nucléotides (mg)	2,8	4,2

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	18,4
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	240
Osmolarité (mOsm/L)	220
Eau (g/100 mL)	90

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy, *J Pediatr.* 1999;134:11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1250747

MODE D'EMPLOI

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal Biberon Nursette®

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en énergie, en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.

Ⓤ D

INDICATION

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en énergie, en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Énergie (kcal/kJ)	81/340	100/420
Protéines (g)	2,4	3
% du total des calories	12	12
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	8,9	11
% du total des calories	44	44
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matières grasses (g)	4,1	5,1
% du total des calories	44	44
Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou de carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH prov- enant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,66	0,81
Acide linolénique (g)	0,073	0,09
ARA (mg)	28	34
ADH (mg)	13,8	17

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	134 3,3	165 4,1
Phosphore (mg) (mmol)	67 2,2	83 2,7
Magnésium (mg) (mmol)	7,3 0,3	9 0,37
Fer (mg)	1,46	1,8
Zinc (mg)	1,22	1,5
Manganèse (mg)	0,0051	0,0063
Cuivre (mg)	0,097	0,12
Iode (mg)	0,02	0,025
Sodium (mg) (mmol)	47 2,0	58 2,5
Potassium (mg) (mmol)	80 2,0	98 2,5
Chlorure (mg) (mmol)	73 2,1	90 2,5
Vitamines		
Vitamine A (UI)	1010	1250
Vitamine D (UI)	195	240
Vitamine E (UI)	5,1	6,3
Vitamine K (mg)	0,0065	0,008
Vitamine C (mg)	16,2	20
Thiamine (mg)	0,162	0,2
Riboflavine (mg)	0,24	0,3
Niacine (mg)	3,2	4
Acide pantothénique (mg)	0,97	1,2
Vitamine B_6 (mg)	0,122	0,15
Acide folique (mg)	0,032	0,04
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00025
Biotine (mg)	0,0032	0,004
Choline (mg)	16,2	20

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Inositol (mg)	36	44
Carnitine (mg)	1,95	2,4
Taurine (mg)	4,9	6
Nucléotides (mg)	3,4	4,2

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	22
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	260
Eau (g/100 mL)	88

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1215248

MODE D'EMPLOI

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Enfamil A+® EnfaCare®

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui sortent de l'hôpital.

Ⓤ D

INDICATION

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui sortent de l'hôpital. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre	par 100 kcal
Énergie (kcal/kJ)	74/310	490/2060	100/420
Protéines (g)	2,1	13,8	2,8
% du total des calories	11	11	11
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé			
Glucides (g)	7,7	51	10,4
% du total des calories	42	42	42
Source : Lactose, extraits secs de sirop de maïs			
Matières grasses (g)	3,9	26	5,3
% du total des calories	47	47	47
Source : Huile végétale à forte teneur en acide oléique (34 %), huile de soya (29 %), huile TCM (20 %), huile de noix de coco (14 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)			
Acide linoléique (g)	0,64 (Poudre) 0,67 (Biberon Nursette®)	4,2	0,9
Acide linolénique (g)	0,07 (Poudre) 0,067 (Biberon Nursette®)	0,47	0,09

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre	par 100 kcal
ARA (mg)	25	168	34
ADH (mg)	12,6	84	17
Minéraux			
Calcium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	89 2,2	590 -	120 3,0
Phosphore (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	49 1,58	330 -	66 2,1
Magnésium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	5,9 0,24	39 -	8 0,33
Fer (mg)	1,33	8,9	1,8
Zinc (mg)	0,92	4,9	1,25
Manganèse (mg)	0,0111	0,074	0,015
Cuivre (mg)	0,089	0,59	0,12
Iode (mg)	0,0155	0,104	0,021
Sélénium (mg)	0,0021	0,0138	0,0028
Sodium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	27 (Poudre) 26 (Biberon Nursette®) 1,13	182 -	35 1,52
Potassium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	78 2,0	520 -	105 2,7
Chlorure (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	58 1,63	380 -	78 2,2
Vitamines			
Vitamine A (UI)	330	2200	450
Vitamine D (UI)	52	350	70
Vitamine E (UI)	3	20	4
Vitamine K (mg)	0,0059	0,039	0,008
Vitamine C (mg)	11,8	79	16
Thiamine (mg)	0,148	0,99	0,2
Riboflavine (mg)	0,148	0,99	0,2

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre	par 100 kcal
Niacine (mg)	0,74 (Poudre) 1,48 (Biberon Nursette®)	4,9	2
Acide pantothénique (mg)	0,63	4,2	0,85
Vitamine B_6 (mg)	0,044 (Poudre) 0,074 (Biberon Nursette®)	0,3	0,1
Acide folique (mg)	0,0192	0,128	0,026
Vitamine B_{12} (mg)	0,00022	0,00148	0,0003
Biotine (mg)	0,0037 (Poudre) 0,0044 (Biberon Nursette®)	0,025	0,006
Choline (mg)	17,8	118	24
Inositol (mg)	22	148	30
Carnitine (mg)	1,48	9,9	2
Taurine (mg)	4,4	30	6
Nucléotides (mg)	3,1	21	4,2

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	18,4 (poudre) 18,3 (biberon Nursette®)
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	310 (poudre) 250 (biberon Nursette®)
Osmolarité (mOsm/L)	280 (poudre) 220 (biberon Nursette®)
Eau (g/100 mL)	89

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Enfamil A+® EnfaCare®	Poudre	363 g	2400 mL (13,5 bottles x 6 oz liq)	18 mois	1171320
	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1215387

MODE D'EMPLOI

POUDRE

MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. N'utilisez que selon les instructions d'un professionnel de la santé. Une hygiène, une préparation, une dilution, un usage ou un entreposage inappropriés peuvent causer de sévères dommages. Bien que cette poudre soit conçue pour les nourrissons prématurés, les préparations pour nourrissons en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou possiblement immunodéprimés, sauf si cela est prescrit et supervisé par le médecin de votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).

2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.

3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la tétée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

NOURRISSONS

Enfamil A+®

Préparation initiale courante à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons nés à terme et en santé.

Ⓤ D

INDICATION

Préparation initiale courante à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons nés à terme et en santé. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,4 (Biberon Nursette®)	10,1
% du total des calories	8	8
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	7,6	57
% du total des calories	44	44
Galacto-oligosaccharides (g)	0,2	1,52
Polydextrose (g)	0,2	1,52
Source : Lactose, galacto-oligosaccharides, polydextrose		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,051 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 0,05 (Conc)	0,38
ARA (mg)	23	172

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
ADH (mg)	11,5 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 11,4 (Conc)	86
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	53 1,32	390 -
Phosphore (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	29 0,94	220 -
Magnésium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	5,4 0,22	40 -
Fer (mg)	1,22 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 1,21 (Conc)	9,1
Zinc (mg)	0,68 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 0,67 (Conc)	5,1
Manganèse (mg)	0,0102 (Poudre) 0,0101 (Conc, PAS & Biberon Nursette®)	0,076
Cuivre (mg)	0,051 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 0,05 (Conc)	0,38
Iode (mg)	0,0102 (Poudre) 0,0101 (Conc, PAS & Biberon Nursette®)	0,076
Sélénium (mg)	0,00189 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 0,00188 (Conc)	0,0141
Sodium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	18,3 (Poudre) 18,2 (Conc, PAS & Biberon Nursette®) 0,79	136 -
Potassium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	73 (Poudre, PAS, Conc & Biberon Nursette®) 1,87	550 -

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Chlorure (mg)	43 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 42 (Conc)	320
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1520
Vitamine D (UI)	41 (Poudre & Biberon Nursette®) 40 (Conc)	300
Vitamine E (UI)	1,35	10,1
Vitamine K (mg)	0,0054 (Poudre) 0,0061 (Liquide)	0,045
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,095 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 0,094 (Conc)	0,71
Niacine (mg)	0,68 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 0,67 (Conc)	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041 (Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 0,04 (Conc)	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,081
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00152
Biotine (mg)	0,002	0,0152
Choline (mg)	16,2	121
Inositol (mg)	4,1(Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 4 (Conc)	30
Carnitine	1,35	10,1
Taurine (mg)	4,1(Poudre, PAS & Biberon Nursette®) 4 (Conc)	30
Nucléotides (mg)	2,8	21

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	12,5
Osmolalité (mOsm/kg H2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	270
Eau (g/100 mL)	90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil A+®	Poudre	663 g	4900 mL (21 bouteilles x 8 oz liq)	18 mois	1278790
	Poudre	992 g	7400 mL (31 bouteilles x 8 oz liq)	18 mois	1278789
	Concentré	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz liq)	15 mois	1269807
	Prête à servir	237 mL	237 mL (1 bouteille x 8 oz liq)	12 mois	2005350
	Biberon Nursette® (détail)	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1269779
	Biberon Nursette® (hôpital)	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	2042056

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le contenant/la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans le contenant/le sachet.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

CONTENANT : Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

BOÎTE : Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets de rechange peuvent être utilisés avec les contenants d'Enfamil A+ réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ seulement.Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel gurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

CONCENTRÉ

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, ouvre- boîtes et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger. Nettoyez le dessus de la boîte avec de l'eau bouillie au préable, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité **égale** de liquide concentré. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

PRÊTE À SERVIR

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. **AGITEZ BIEN LA BOUTEILLE**, enlevez le sceau protecteur autour du couvercle, puis retirez le couvercle et l'opercule en aluminium.	3. Versez dans le ou les biberons. Recouvrez le biberon de son couvercle et **AGITEZ BIEN.**

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des bouteilles ouvertes et des biberons apprêtés peut se gâter rapidement. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de L'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Enfamil A+® hypercalorique Biberon Nursette®

Préparation hypercalorique à base de lait de vache conçue pour les nourrissons ayant d'importants besoins en énergie ou chez lesquels il faut restreindre l'apport liquidien.

Ⓤ D

INDICATION

Préparation hypercalorique à base de lait de vache conçue pour les nourrissons ayant d'importants besoins en énergie ou chez lesquels il faut restreindre l'apport liquidien. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL
Énergie (kcal/kJ)	81/340
Protéines (g)	1,7
% du total des calories	8,5
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé	
Glucides (g)	8,8
% du total des calories	43,5
Source : Lactose	
Matières grasses (g)	4,3
% du total des calories	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Acide linoléique (g)	0,65
Acide linolénique (g)	0,065
ARA (mg)	28
ADH (mg)	13,8

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	63 1,58
Phosphore (mg) (mmol)	35 1,13
Magnésium (mg) (mmol)	6,5 0,27
Fer (mg)	1,46
Zinc (mg)	0,81
Manganèse (mg)	0,0122
Cuivre (mg)	0,061
Iode (mg)	0,0122
Sélénium (mg)	0,0023
Sodium (mg) (mmol)	22 0,95
Potassium (mg) (mmol)	88 2,2
Chlorure (mg) (mmol)	51 1,44
Vitamines	
Vitamine A (UI)	240
Vitamine D (UI)	49
Vitamine E (UI)	1,62
Vitamine K (mg)	0,0073
Vitamine C (mg)	9,7
Thiamine (mg)	0,065
Riboflavine (mg)	0,114
Niacine (mg)	0,81
Acide pantothénique (mg)	0,41
Vitamine B_6 (mg)	0,049
Acide folique (mg)	0,013
Vitamine B_{12} (mg)	0,00024
Biotine (mg)	0,0024

Analyse	par 100 mL
Choline (mg)	19,5
Inositol (mg)	4,9
Carnitine (mg)	1,62
Taurine (mg)	4,9
Nucléotides (mg)	3,4

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	15,4
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	360
Osmolarité (mOsm/L)	320
Eau (g/100 mL)	88

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil A+® Hypercalorique	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1210915

MODE D'EMPLOI

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Enfamil®

Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé.

Ⓤ D

INDICATION

Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Énergie (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,4	10,8
% du total des calories	8,5	8,5
Source : Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum		
Glucides (g)	7,4	56
% du total des calories	43,5	43,5
Source : Lactose		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)		
Acide linoléique (g)	0,58	4,4
Acide linolénique (g)	0,054	0,41
Minéraux		
Calcium (mg)	53	400
Phosphore (mg)	29	220
Magnésium (mg)	5,4	41
Fer (mg)	1,22	9,2
Zinc (mg)	0,68	5,1
Manganèse (mg)	0,0101	0,077

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,077
Sélénium (mg)	0,00189	0,0143
Sodium (mg)	18	138
Potassium (mg)	73	550
Chlorure (mg)	43	320
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1540
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0061	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,095	0,72
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31
Acide folique (mg)	0,0108	0,082
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00154
Biotine (mg)	0,002	0,0154
Choline (mg)	16,2	123
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31
Nucléotides (mg)	2,8	22

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	12,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	270
Eau (g/100 mL)	90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals. Atlanta,* GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil®	Poudre	900 g	6900 mL (29 bouteilles x 8 oz liq)	36 mois	1274015
	Concentré	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz liq)	15 mois	1015439

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

CONCENTRÉ

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, ouvre-boîtes et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger. Nettoyez le dessus de la boîte avec de l'eau bouillie au préable, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité **égale** de liquide concentré. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil®

Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé. Préparation à teneur plus faible en fer que les autres marques*, enrichie de 7,4 mg/L de fer, conformément aux recommandations des experts quant à la composition des préparations[1].

***Enfamil A+®, Enfamil® : 12,2 mg/L; Similac® avec oméga 3 et oméga 6: 12 mg/L; Nestlé® Bon Départ®, Nestlé® Bon Départ® avec oméga 3 et oméga 6: 10 mg/L. Données tirées des étiquettes de produits canadiens, achetés au mois de novembre 2012.**

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé. Préparation à teneur plus faible en fer que les autres marques*, enrichie de 7,4 mg/L de fer, conformément aux recommandations des experts quant à la composition des préparations[1].

*Enfamil A+®, Enfamil®: 12,2 mg/L; Similac® avec oméga 3 et oméga 6: 12 mg/L; Nestlé® Bon Départ®, Nestlé® Bon Départ® avec oméga 3 et oméga 6: 10 mg/L. Données tirées des étiquettes de produits canadiens, achetés au mois de novembre 2012.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Énergie (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,42	10,8
% du total des calories	8,5	8,5
Source: Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	7,4	56
% du total des calories	43,5	43,5
Source: Lactose		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48

Centre de renseignements aux hôpitaux: 1 800 263-1143
Bureau des commandes: 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)		
Acide linoléique (g)	0,58 (Poudre) 0,54 (Liq)	4,4
Acide linolénique (g)	0,054	0,41
Minéraux		
Calcium (mg)	53	400
Phosphore (mg)	29	220
Magnésium (mg)	5,4	41
Fer (mg)	0,74	5,6
Zinc (mg)	0,68	5,1
Manganèse (mg)	0,0101	0,077
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,077
Sélénium (mg)	0,00189	0,0143
Sodium (mg)	18,3	138
Potassium (mg)	73	550
Chlorure (mg)	43	320
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1540
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0061	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,095	0,72
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31
Acide folique (mg)	0,0108	0,082
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00154
Biotine (mg)	0,002	0,0154

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Choline (mg)	16,2	123
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31
Nucléotides (mg)	2,8	22

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[2]	12,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	270
Eau (g/100 mL)	90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[3].»

1. Raiten DJ, *et al.* Eds. Life Sciences Research Office. Assessment of nutrient requirements for infant formulas. *J Nutr.* 1998;128(11S):2059S-2294S. 2. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 3. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil	Poudre	900 g	6900 mL (29 bouteilles x 8 oz liq)	36 mois	1274014
	Concentré	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz liq)	15 mois	1015435

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

CONCENTRÉ

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, ouvre-boîtes et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger. Nettoyez le dessus de la boîte avec de l'eau bouillie au préable, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité **égale** de liquide concentré. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

Enfamil A+ Gentlease®

Préparation de remplacement de premier choix à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour être facile à digérer*.

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation de remplacement de premier choix à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour être facile à digérer*. Contient des protéines de lactosérum et de caséine partiellement hydrolysées, une teneur réduite en lactose† et de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Énergie (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,56 (Poudre) 1,6 (Prête à l'emploi)	11,7
% du total des calories	9	9
Source : Lait écrémé partiellement hydrolysé et concentré de protéines de lactosérum		
Glucides (g)	7,3	55
% du total des calories	43	43
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54 (Poudre) 0,5 (Prête à l'emploi)	4,1

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Acide linolénique (g)	0,049 (Poudre) 0,05 (Prête à l'emploi)	0,37
ARA (mg)	23	173
ADH (mg)	11,5 (Poudre) 11 (Prête à l'emploi)	87
Minéraux		
Calcium (mg)	55	420
Phosphore (mg)	31	230
Magnésium (mg)	5,4	41
Fer (mg)	1,22	9,2
Zinc (mg)	0,68	5,1
Manganèse (mg)	0,0101	0,077
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,077
Sélénium (mg)	0,00189	0,0143
Sodium (mg)	24 (Poudre) 27 (Prête à l'emploi)	184
Potassium (mg)	73	550
Chlorure (mg)	43	320
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1530
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0061	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,095	0,71
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Acide folique (mg)	0,0108	0,082
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00153
Biotine (mg)	0,002	0,0153
Choline (mg)	16,2	122
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	14 (Poudre) 14,1 (Prête à l'emploi)
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	230 (Poudre) 200 (Prête à l'emploi)
Osmolarité (mOsm/L)	210 (Poudre) 180 (Prête à l'emploi)
Eau (g/100 mL)	90

*Semblable à toutes les préparations pour nourrissons.

†Environ 1/5e de la quantité de lactose que l'on trouve dans une préparation courante à base de lait.

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Enfamil A+ Gentlease®	Poudre	629 g	4700 mL (20 bouteilles x 8 oz liq)	21 mois	1278788
	Poudre	942 g	7100 mL (30 bouteilles x 8 oz liq)	21 mois	1278787
	Prête à l'emploi	237 mL	237 mL (1 bouteille x 8 oz)	12 mois	2035944

MODE D'EMPLOI

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).

2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.

3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le

contenant/la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans le contenant/le sachet.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

CONTENANT :

Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ Gentlease® seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

BOÎTE

Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets de rechange peuvent être utilisés avec les contenants d'Enfamil A+ Gentlease® réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ Gentlease® seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant,

puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

PRÊTE À SERVIR

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé. Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. **AGITEZ BIEN LA BOUTEILLE, enlevez le sceau protecteur autour du couvercle,** puis retirez le couvercle et l'opercule en aluminium.	3. Versez dans le ou les biberons. Recouvrez le biberon de son couvercle et **AGITEZ BIEN.**

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des bouteilles ouvertes et des biberons préparés est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte ou le biberon préparé s'ils sont demeurés plus de 2 heures sans être réfrigérés. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment†

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et avec de l'amidon de riz pour les nourrissons qui régurgitent fréquemment ou qui ont besoin d'une préparation épaissie.

†Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et avec de l'amidon de riz pour les nourrissons qui régurgitent fréquemment ou qui ont besoin d'une préparation épaissie. Contient deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose) et de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Protéines (g)	1,7	12
% du total des calories	10	10
Source : Lait écrémé		
Glucides (g)	7,6	56
% du total des calories	44	44
Galacto-oligosaccharides	0,2	1,5
Polydextrose	0,2	1,5
Source : Lactose, amidon de riz, maltodextrine, galacto-oligosaccharides, polydextrose		
Matières grasses (g)	3,4	25
% du total des calories	46	46

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juillet 2018 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Source : Oléine d'huile de palme (43,5 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,5	3,9
Acide linolénique (g)	0,05	0,4
ARA (mg)	23	169
ADH (mg)	11,5	85
Minéraux		
Calcium (mg)	53	390
Phosphore (mg)	36	260
Magnésium (mg)	5,4	40
Fer (mg)	1,22	9
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0101	0,075
Cuivre (mg)	0,051	0,37
Iode (mg)	0,0101	0,075
Sélénium (mg)	0,00189	0,0139
Sodium (mg)	27	200
Potassium (mg)	73	540
Chlorure (mg)	51	370
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1490
Vitamine D (UI)	41	300
Vitamine E (UI)	1,35	9,9
Vitamine K (mg)	0,0061	0,045
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,095	0,7
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Acide folique (mg)	0,0108	0,08
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00149
Biotine (mg)	0,002	0,0149
Choline (mg)	16,2	119
Inositol (mg)	4,1	30
Carnitine (mg)	1,35	9,9
Taurine (mg)	4,1	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	15,3
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	230
Osmolarité (mOsm/L)	210
Eau (g/100 mL)	90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation.»[2].

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment†	Poudre	629 g	5000 mL (21 bouteilles x 8 oz liq)	18 mois	2047807

MODE D'EMPLOI

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons.

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN. LAISSER REPOSER LE BIBERON 5 MINUTES.**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la tétée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le contenant seulement avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+® pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

Enfamil A+® Sans lactose

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons sensibles au lactose.

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons sensibles au lactose. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3). Non destinée aux nourrissons ou aux enfants atteints de galactosémie.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale
Calories (kcal/kJ)	68/280
Protéines (g)	1,42
% du total des calories	8,5
Source : Isolats de protéines laitières	
Glucides (g)	7,4
% du total des calories	43,5
Source : Extraits secs de sirop de maïs	
Matières grasses (g)	3,6
% du total des calories	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Acide linoléique (g)	0,54 (Biberon Nursette®)
Acide linolénique (g)	0,051 (Biberon Nursette®)
ARA (mg)	23
ADH (mg)	11,5
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	55 1,38

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Décembre 2018 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale
Phosphore (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	31 1,0
Magnésium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	5,4 0,22
Fer (mg)	1,22
Zinc (mg)	0,68
Manganèse (mg)	0,0101
Cuivre (mg)	0,051
Iode (mg)	0,0101
Sélénium (mg)	0,00189
Sodium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	20 0,88
Potassium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	74 1,9
Chlorure (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	45 1,28
Vitamines	
Vitamine A (UI)	200
Vitamine D (UI)	41
Vitamine E (UI)	1,35
Vitamine K (mg)	0,0061
Vitamine C (mg)	8,1
Thiamine (mg)	0,054
Riboflavine (mg)	0,095
Niacine (mg)	0,68
Acide pantothénique (mg)	0,34
Vitamine B_6 (mg)	0,041
Acide folique (mg)	0,0108
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002
Biotine (mg)	0,002
Choline (mg)	16,2
Inositol (mg)	4,1

Analyse	par 100 mL dilution normale
Carnitine (mg)	1,35
Taurine (mg)	4,1
Nucléotides (mg)	2,8
Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	13,2 (Biberon Nursette®) 13 (Liq)
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	200 (Biberon Nursette®)
Osmolarité (mOsm/L)	182 (Biberon Nursette®)
Eau (g/100 mL)	91

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil A+® Sans lactose	Concentré	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz liq)	12 mois	1241760
	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1271623

MODE D'EMPLOI

CONCENTRÉ

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, ouvre-boîtes et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger. Nettoyez le dessus de la boîte avec de l'eau bouillie au préable, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité **égale** de liquide concentré. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Enfamil A+® Soya

Préparation à base de soya, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons qui ont besoin d'une préparation sans lait pour des raisons sanitaires ou culturelles.

Ⓤ **Ingrédients parèves; installations laitières utilisées**

INDICATIONS

Préparation à base de soya, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons qui ont besoin d'une préparation sans lait pour des raisons sanitaires ou culturelles. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Calories (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,69	12,7
% du total des calories	10	10
Source : Isolats de protéines de soya (avec ajout de L-méthionine)		
Glucides (g)	7,2	54
% du total des calories	42	42
Source : Extraits secs de sirop de maïs		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54 (Poudre) 0,58 (Biberon Nursette®)	4,1
Acide linolénique (g)	0,051 (Poudre) 0,054 (Biberon Nursette®)	0,38
ARA (mg)	23	173
ADH (mg)	11,5	86

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	71 1,77	530 -
Phosphore (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	47 1,51	350 -
Magnésium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	5,4 0,22	41 -
Fer (mg)	1,22	9,2
Zinc (mg)	0,81	6,1
Manganèse (mg)	0,0169	0,127
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,076
Sélénium (mg)	0,00189	0,0142
Sodium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	24 1,06	183 -
Potassium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	81 2,1	610 -
Chlorure (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	54 1,52	410 -
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1530
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0061	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,061	0,46
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31
Acide folique (mg)	0,0108	0,081
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00153

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Biotine (mg)	0,002	0,0153
Choline (mg)	16,2	122
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	15,6 (Poudre) 15,8 (Biberon Nursette®)
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	178 (Poudre) 200 (Biberon Nursette®)
Osmolarité (mOsm/L)	160 (Poudre) 180 (Biberon Nursette®)
Eau (g/100 mL)	90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation.»[2].

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Enfamil A+® Soya	Poudre	730 g	5500 mL (23 bouteilles x 8 oz liq)	18 mois	1242610
	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1271716

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).

2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.

3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Nutramigen® A+® avec LGG®

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer qui procure une alimentation adaptée aux bébés présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment aux bébés aux prises avec des coliques*.

***Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache**

Non casher

INDICATIONS

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer qui procure une alimentation adaptée aux bébés présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment aux bébés aux prises avec des coliques*.

*Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Protéines (g)	1,9	14
% du total des calories	11	11
Source : Hydrolysat de caséine, mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	7,1	52
% du total des calories	41	41
Source : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ADH et ARA provenant d'un mélange d'huiles d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,6	4,3
Acide linolénique (g)	0,1	0,4
ARA (mg)	23	172
ADH (mg)	12	86

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Lactobacillus rhamnosus GG (UFC)	1,35 x 10^7	1x10^8
Minéraux		
Calcium (mg)	65	470
Phosphore (mg)	36	260
Magnésium (mg)	5,5	40
Fer (mg)	1,24	9,1
Zinc (mg)	0,69	5,1
Manganèse (mg)	0,0172	0,126
Cuivre (mg)	0,052	0,38
Iode (mg)	0,0103	0,076
Sélénium (mg)	0,00192	0,0141
Sodium (mg)	32	237
Potassium (mg)	76	556
Chlorure (mg)	59	430
Vitamines		
Vitamine A (UI)	210	1520
Vitamine D (UI)	34	250
Vitamine E (UI)	1,37	10,1
Vitamine K (mg)	0,0062	0,045
Vitamine C (mg)	8,2	61
Thiamine (mg)	0,055	0,4
Riboflavine (mg)	0,062	0,45
Niacine (mg)	0,69	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3
Acide folique (mg)	0,011	0,081
Vitamine B_{12} (mg)	0,00021	0,00152
Biotine (mg)	0,0021	0,0152
Choline (mg)	16,5	121
Inositol (mg)	11,7	86
Carnitine (mg)	1,37	10,1

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Taurine (mg)	4,1	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	270
Eau (g/100 mL)	90

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Nutramigen® A+® avec LGG®	Poudre	561 g	4 100 mL (17,5 bouteilles x 237 mL/8 oz liq.)	18 mois	2015524

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène,de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir la mesure, les biberons, tétines, couvercles et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN.**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases tassées

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation apprêtée à une température excédant 40 °C (104 °F), sous peine de limiter les bienfaits de la culture LGG®. Une préparation chauffée au four à micro-ondes risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

LGG est une marque déposée de Chr. Hansen A/S.

Nutramigen® A+®

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment des bébés aux prises avec des coliques*.

***Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache**

Non casher

INDICATIONS

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment des bébés aux prises avec des coliques*. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

*Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2080
Protéines (g)	1,89	13,9
% du total des calories	11	11
Source : Caséine hydrolysée, mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	7	51
% du total des calories	41	41
Source (Poudre) : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié Source (Biberon Nursette®) : Sirop de maïs, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	3,6	26
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique(14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,58	4,3
Acide linolénique (g)	0,054	0,4

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
ARA (mg)	23	169
ADH (mg)	11,5	85
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	64 1,59	470 -
Phosphore (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	35 1,13	260 -
Magnésium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	5,4 0,22	40 -
Fer (mg)	1,22	9
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0169	0,124
Cuivre (mg)	0,051	0,37
Iode (mg)	0,0101	0,075
Sélénium (mg)	0,00189	0,0139
Sodium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	32 1,38	230 -
Potassium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	74 1,9	550 -
Chlorure (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	58 1,64	430 -
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1490
Vitamine D (UI)	34	250
Vitamine E (UI)	1,35	9,9
Vitamine K (mg)	0,0061	0,045
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,061	0,45
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Acide folique (mg)	0,0108	0,08
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00149
Biotine (mg)	0,002	0,0149
Choline (mg)	16,2	119
Inositol (mg)	11,5	85
Carnitine (mg)	1,35	9,9
Taurine (mg)	4,1	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300 (Poudre) 320 (Biberon Nursette®)
Osmolarité (mOsm/L)	270 (Poudre) 290 (Biberon Nursette®)
Eau (g/100 mL)	90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les etiquettes des produits pour obtenir les plus recents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Nutramigen® A+®	Poudre	454 g	3300 mL (14 bouteilles x 8 oz liq)	18 mois	1239201
	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1272691

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN.**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases tassées

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

PURAMINO A+®

Préparation hypoallergénique à base d'acides aminés libres (100 %) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons et des tout-petits atteints d'une forme grave d'allergie aux protéines du lait de vache et d'allergies alimentaires multiples ou d'autres troubles nécessitant une préparation à base d'acides aminés.

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation hypoallergénique à base d'acides aminés libres (100 %) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons et des tout-petits atteints d'une forme grave d'allergie aux protéines du lait de vache et d'allergies alimentaires multiples ou d'autres troubles nécessitant une préparation à base d'acides aminés. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et de l'huile TCM.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Équivalent protéique (g)	1,89	13,9
% du total des calories	11	11
Source : Prémélange d'acides aminés		
Glucides (g)	7,2	53
% du total des calories	42	42
Source : Extraits secs de sirop de maïs, modifié amidon de manioc		
Matières grasses (g)	3,6	26
% du total des calories	47	47
Source : Huile de tournesol riche en acide oléique (34,5 %), huile TCM (33 %), huile de soya (30 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,58	4,3
Acide linolénique (g)	0,054	0,4
ARA (mg)	23	169
DHA (mg)	11,5	85

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Minéraux		
Calcium (mg)	64	470
Phosphore (mg)	35	260
Magnésium (mg)	7,4	55
Fer (mg)	1,22	9
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0169	0,124
Cuivre (mg)	0,051	0,37
Iode (mg)	0,0101	0,075
Sélénium (mg)	0,00189	0,0139
Sodium (mg)	32	230
Potassium (mg)	74	550
Chlorure (mg)	58	430
Vitamines		
Vitamines A (UI)	200	1490
Vitamines D (UI)	34	250
Vitamines E (UI)	1,35	9,9
Vitamines K (mg)	0,0061	0,045
Vitamines C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,061	0,45
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,08
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00149
Biotine (mg)	0,002	0,0149
Choline (mg)	16,2	119
Inositol (mg)	11,5	85
Carnitine (mg)	1,35	9,9
Taurine (mg)	4,1	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	350
Osmolarité (mOsm/L)	320
Eau (g/100 mL)	90

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
PURAMINO A+®	Poudre	400 g	2900 mL (12 bouteilles x 8 oz liq)	15 mois	1233351

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN.**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
Biberon de **65 mL**	**60 mL** (1/4 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
Biberon de **130 mL**	**120 mL** (1/2 tasse)	**4 mesures** rases non tassées
Biberon de **195 mL**	**180 mL** (3/4 tasse)	**6 mesures** rases non tassées
Biberon de **260 mL**	**240 mL** (1 tasse)	**8 mesures** rases non tassées

1 mesure rase non tassée de poudre correspond à 4,5 g. Chaque mesure ajoute environ 3 mL à la quantité de préparation apprêtée.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la tétée. La préparation apprêtée restant dans le biberon entamé doit être jetée dans un délai d'une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

PURAMINO A+® JUNIOR

Préparation hypoallergénique à base d'acides aminés libres (100 %) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des enfants de plus de 12 mois atteints d'une forme grave d'allergie aux protéines du lait de vache et d'allergies alimentaires multiples ou d'autres troubles nécessitant une préparation à base d'acides aminés.

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation hypoallergénique à base d'acides aminés libres (100 %) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des enfants de plus de 12 mois atteints d'une forme grave d'allergie aux protéines du lait de vache et d'allergies alimentaires multiples ou d'autres troubles nécessitant une préparation à base d'acides aminés. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et de l'huile de TCM.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Calories (kcal/kJ)	100/420	490/2050
Équivalent protéique (g)	2,8	14
% du total des calories	11	11
Source : Prémélange d'acides aminés		
Glucides (g)	12	59
% du total des calories	49	49
Source : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	4,5	22
% du total des calories	40	40
Source : Huile de tournesol riche en acide oléique (46 %), huile de TCM (33 %), huile de soya (20 %), ADH provenant de l'huile d'organismes unicellulaires (1,3 %)		
Acide linoléique (g)	0,6	2,9
Acide linolénique (g)	0,06	0,3
ARA (mg)	0	0
DHA (mg)	23	113

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Minéraux		
Calcium (mg)	100	490
Phosphore (mg)	60	290
Magnésium (mg)	16	78
Fer (mg)	1	4.9
Zinc (mg)	0,9	4,4
Manganèse (mg)	0,057	0,28
Cuivre (mg)	0,11	0,54
Iode (mg)	0,015	0,074
Sélénium (mg)	0,0032	0,0157
Chrome (mg)	0,003	0,0147
Potassium (mg)	100	490
Chlorure (mg)	61	300
Vitamines		
Vitamines A (UI)	200	990
Vitamines D (UI)	56	270
Vitamines E (UI)	1,79	8,8
Vitamines K (mg)	0,004	0,02
Vitamines C (mg)	10	49
Thiamine (mg)	0,075	0,37
Riboflavine (mg)	0,01	0,49
Niacine (mg)	1	4,9
Acide pantothénique (mg)	0,43	2,1
Vitamine B_6 (mg)	0,1	0,49
Acide folique (mg)	0,015	0,074
Vitamine B_{12} (mg)	0,00025	0,00123
Biotine (mg)	0,0022	0,0108
Choline (mg)	22	108
Inositol (mg)	17	83
Carnitine (mg)	2	9,8
Taurine (mg)	6	29

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	24
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	570
Osmolarité (mOsm/L)	480
Eau (g/100 mL)	85

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez l'étiquette du produit pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
PURAMINO A+® JUNIOR	Poudre	400 g	2000 mL (8 biberons de 8 oz liq.)	15 mois	2047834

MODE D'EMPLOI

UTILISER SEULEMENT SELON LES DIRECTIVES D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. PURAMINO A+® JUNIOR N'EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE COMME UNE PRÉPARATION POUR NOURRISSONS.

MODE D'EMPLOI

ALIMENTATION PAR VOIE ORALE :

Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation‡. Il est important de suivre les instructions ci-dessous. Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité requise de poudre PURAMINO A+® JUNIOR. **Bien mélanger.**

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêté, ce produit est hautement périssable. Servir immédiatement la boisson préparée ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F). Consommer dans les 24 heures suivant la préparation. Bien agiter avant l'utilisation. Ne pas utiliser le

produit apprêté s'il est demeuré plus de 2 heures au total sans être réfrigéré. Ne pas congeler le produit apprêté. Jeter toute boisson entamée non consommée après une heure.

‡Si on vous indique d'utiliser la mesure fournie dans la boîte pour obtenir 30 kcal/30 mL : **Chaque mesure rase non tassée (6,8 g) de poudre ajoutée à 30 mL (1 oz liq. US) d'eau donnera environ 35 mL (1,2 oz liq. US) de produit apprêté.**

Pour obtenir environ 177 mL (environ 6 oz liq. US) de produit apprêté, ajouter 5 mesures rases non tassées (34 g) de poudre à 152 mL (5 oz liq. US) d'eau. Pour obtenir environ 246 mL (environ 8 oz liq. US) de produit apprêté, ajouter 7 mesures rases non tassées (47,6 g) de poudre à 211 mL (7 oz liq. US) d'eau.

Cette boîte de 400 g de PURAMINO A+® JUNIOR produira approximativement 2 L (2,1 pintes US) de boisson à 30 kcal/30 mL.

MISE EN GARDE : Ne pas faire bouillir le produit. Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour apprêter ou chauffer le produit, car celui-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Conserver la mesure **SÈCHE** dans la boîte. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (IV).

Références

1. Fomon SF, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr* 1999;134:11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4. 3. Robbins ST, Meyers R, éd. *Infant Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities.* Chicago, Ill: American Dietetic Association; 2011. 4. Telang S, Berseth CL, Ferguson PW, *et al.* Fortifying fresh human milk with commercial powdered human milk fortifiers does not affect bacterial growth during 6 hours at room temperature. *J Am Diet Assoc.* 2005;105:1567-1572

Pregestimil® A+®

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons atteints d'un trouble de malabsorption des graisses et pouvant être sensibles aux protéines entières.

Non casher

INDICATIONS

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons atteints d'un trouble de malabsorption des graisses et pouvant être sensibles aux protéines entières. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Protéines (g)	1,89	14
% du total des calories	11	11
Source : Caséine hydrolysée, mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	6,9	51
% du total des calories	40 (Poudre) 41 (Biberon Nursette®)	40
Source (Poudre) : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié Source (Biberon Nursette®) : Sirop de maïs, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	3,8	28
% du total des calories	49 (Poudre) 48 (Biberon Nursette®)	49
Source (Poudre) : Huile TCM (55 %), huile de soya (35 %), huile de maïs (10 %), huile de carthame riche en acide oléique (7,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %) Source (Biberon Nursette®) : Huile TCM (55 %), huile de soya (35 %), huile de carthame riche en acide oléique (7,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Acide linoléique (g)	0,64	4,7
Acide linolénique (g)	0,064 (Poudre) 0,081 (Biberon Nursette®)	0,48
ARA (mg)	23	170
ADH (mg)	11,5	85
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	64 1,59	470 -
Phosphore (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	35 1,13	260 -
Magnésium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	5,4 0,22	40 -
Fer (mg)	1,22	9
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0169	0,125
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,075
Sélénium (mg)	0,00189	0,014
Sodium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	32 1,38	240 -
Potassium (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	74 1,9	550 -
Chlorure (mg) (mmol - Biberon Nursette®)	58 1,64	430 -
Vitamines		
Vitamine A (UI)	240	1750
Vitamine D (UI)	34	250
Vitamine E (UI)	2,7	20
Vitamine K (mg)	0,0081	0,06
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,061	0,45

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,08
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,0015
Biotine (mg)	0,002	0,015
Choline (mg)	16,2	120
Inositol (mg)	11,5	85
Carnitine (mg)	1,35	10
Taurine (mg)	4,1	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	320 (Poudre) 290 (Biberon Nursette®)
Osmolarité (mOsm/L)	280 (Poudre) 260 (Biberon Nursette®)
Eau (g/100 mL)	88 (Poudre) 90 (Biberon Nursette®)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Pregestimil® A+®	Poudre	454 g	3400 mL (14 bouteilles x 8 oz liq)	21 mois	1238161
	Biberon Nurssette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1273987

MODE D'EMPLOI

POUDRE

MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. N'utilisez que selon les instructions d'un professionnel de la santé. Une hygiène, une préparation, une dilution, un usage ou un entreposage inappropriés peuvent causer de sévères dommages. Bien que cette poudre soit conçue pour les nourrissons prématurés, les préparations pour nourrissons en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou possiblement immunodéprimés, sauf si cela est prescrit et supervisé par le médecin de votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).

2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.

3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN.**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure rase** tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures rases** tassées
195 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures rases** tassées
260 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures rases** tassées

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

BIBERONS NURSETTE®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Enfamil A+® 2

Préparation de transition à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation de transition à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus. Contient des teneurs en calcium, en fer et en protéines adaptée à l'âge. Contient aussi de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Proteines (g)	1,76 (Poudre & Conc) 1,8 (PAS)	12,9
% du total des calories	10	10
Source : Lait écrémé		
Glucides (g)	7,3 (Poudre) 7,7 (Conc) 7,1 (PAS)	54
% du total des calories	42 (Poudre & PAS) 45 (Conc)	42
Galacto-oligosaccharides (g)	0,2	1,49
Polydextrose (g)	0,2	1,49
Source : Lactose, extraits secs de sirop de maïs, galacto-oligosaccharides, polydextrose		
Matières grasses (g)	3,6 (Poudre & PAS) 3,4 (Conc)	26

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
% du total des calories	48 (Poudre & PAS) 45 (Conc)	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54 (Poudre) 0,55 (Conc) 0,5 (PAS)	4
Acide linolénique (g)	0,052 (Poudre) 0,047 (Conc) 0,1 (PAS)	0,38
ARA (mg)	23	169
ADH (mg)	11,5 (Poudre & Conc) 11 (PAS)	84
Minéraux		
Cendre (g)	0,68 (Poudre) 0,47 (Conc & PAS)	5
Calcium (mg)	132 (Poudre) 80 (Conc) 81 (PAS)	970
Phosphore (mg)	88 (Poudre) 53 (Conc) 54 (PAS)	650
Magnésium (mg)	5,4 (Poudre & PAS) 5,5 (Conc)	40
Fer (mg)	1,01	7,4
Zinc (mg)	0,68 (Poudre & PAS) 0,65 (Conc)	5
Manganèse (mg)	0,0101 (Poudre & PAS) 0,0108 (Conc)	0,074

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Cuivre (mg)	0,051 (Poudre & PAS) 0,058 (Conc)	0,37
Iode (mg)	0,0068 (Poudre & PAS) 0,0169 (Conc)	0,05
Sélénium (mg)	0,00189 (Poudre & PAS) 0,002 (Conc)	0,0139
Sodium (mg)	24 (Poudre & PAS) 27 (Conc)	179
Potassium (mg)	88 (Poudre & PAS) 91 (Conc)	650
Chlorure (mg)	54	400
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200 (Poudre & PAS) 210 (Conc)	1490
Vitamine D (UI)	41	300
Vitamine E (UI)	1,35	9,9
Vitamine K (mg)	0,0061	0,045
Vitamine C (mg)	8,1 (Poudre & PAS) 5,5 (Conc)	60
Thiamine (mg)	0,054 (Poudre & PAS) 0,068 (Conc)	0,4
Riboflavine (mg)	0,095 (Poudre & PAS) 0,088 (Conc)	0,7
Niacine (mg)	0,68 (Poudre & PAS) 0,71 (Conc)	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Vitamine B_6 (mg)	0,041 (Poudre & PAS) 0,043 (Conc)	0,3
Acide folique (mg)	0,0108 (Poudre & PAS) 0,0128 (Conc)	0,079
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00149
Biotine (mg)	0,002	0,0149
Choline (mg)	16,2	119
Inositol (mg)	4,1 (Poudre & PAS) 12,2 (Conc)	30
Carnitine (mg)	1,35	9,9
Taurine (mg)	4,5 (Poudre) 3,5 (Conc) 3,8 (PAS)	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	17,6 (Poudre) 16,8 (Conc) 16,6 (PAS)
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	270 (Poudre) 280 (Conc) 250 (PAS)
Osmolarité (mOsm/L)	240 (Poudre) 250 (Conc) 230 (PAS)
Eau (g/100 mL)	89 (Poudre) 90 (Conc & PAS)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil® A+® 2	Poudre	550 g	4000 mL (17 bouteilles x 8 oz liq)	18 mois	2014690
	Poudre	992 g	7300 mL (31 bouteilles x 8 oz liq)	18 mois	2014689
	Concentré	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz liq)	12 mois	2015336
	Prêt à servir	237 mL	237 mL (1 bouteille x 8 oz liq)	12 mois	2032716

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui. Demandez au médecin de votre bébé s'il est nécessaire d'utiliser de l'eau bouillie et refroidie pour apprêter la préparation et de faire bouillir la mesure, les ustensiles, les biberons et les tétines propres avant de les utiliser.

1. Lavez bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. Verser la quantité d'eau dans la bouteille. Ajouter la poudre.	3. Recouvrir la bouteille de son couvercle et **BIEN AGITER.**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le contenant/la boite pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans le contenant/le sachet.

Pour obtenir	Eau	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure rase** non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures rases** non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures rases** non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures rases** non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

CONTENANT: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+® 2 seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau

sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

BOÎTE: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets de rechange peuvent être utilisés avec les contenants d'Enfamil A+® 2 réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+® 2 seulement.Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

CONCENTRÉ

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utiliser selon les instructions de votre médecin.

1. Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon avant d'apprêter la préparation.	2. Nettoyez le dessus de la boîte, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Versez la quantité d'eau appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité **égale** de liquide concentré. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN.**

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée.

Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

PRÊT À SERVIR

Bien agiter avant d'ouvrir. Retirer le sceau protecteur autour du couvercle de la bouteille, retirer le couvercle et l'opercule en aluminium et servir. Réfrigérer après l'ouverture et utiliser dans les 48 heures.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient le mieux à votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé s'il est nécessaire de faire bouillir les ustensiles, les biberons et les tétines propres avant de les utiliser.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Lavez bien les mains avec de l'eau et du savon avant d'apprêter la préparation.	2. **AGITEZ BIEN LA BOUTEILLE**, enlevez le sceau protecteur autour du couvercle, puis retirez le couvercle et l'opercule en aluminium.	3. Versez dans le ou les biberons. Recouvrez le biberon de son couvercle et **AGITEZ BIEN.**

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte ou le biberon préparé s'ils sont demeurés plus de 2 heures sans être réfrigérés. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non-consommée après une heure.

Enfamil® 2

Préparation de transition pour nourrissons à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation de transition pour nourrissons à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2100
Protéines (g)	1,7 (Poudre) 1,76 (Conc)	13
% du total des calories	10	10
Source : Lait écrémé		
Glucides (g)	7,4 (Poudre) 7,7 (Conc)	55
% du total des calories	45 (Poudre) 44 (Conc)	45
Source : Lactose, sirop de maïs		
Matières grasses (g)	3,4	25
% du total des calories	45 (Poudre) 46 (Conc)	45
Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)		
Acide linoléique (g)	0,6 (Poudre) 0,55 (Conc)	4,6
Acide linolénique (g)	0,06 (Poudre) 0,047 (Conc)	0,4
Minéraux		
Calcium (mg)	80	600

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Phosphore (mg)	52 (Poudre) 53 (Conc)	390
Magnésium (mg)	5,5	41
Fer (mg)	1,2 (Poudre) 1,22 (Conc)	9
Zinc (mg)	0,6 (Poudre) 0,65 (Conc)	4,8
Manganèse (mg)	0,01 (Poudre) 0,0108 (Conc)	0,06
Cuivre (mg)	0,06 (Poudre) 0,058 (Conc)	0,4
Iode (mg)	0,02 (Poudre) 0,0169 (Conc)	0,1
Sélénium (mg)	0,002	0,02
Sodium (mg)	27	200
Potassium (mg)	90 (Poudre) 91 (Conc)	680
Chlorure (mg)	60 (Poudre) 54 (Conc)	450
Vitamines		
Vitamine A (UI)	208 (Poudre) 210 (Conc)	1560
Vitamine D (UI)	40 (Poudre) 41 (Conc)	300
Vitamine E (UI)	1,3 (Poudre) 1,35 (Conc)	10
Vitamine K (mg)	0,006	0,05
Vitamine C (mg)	5,5	41
Thiamine (mg)	0,07 (Poudre) 0,068 (Conc)	0,5
Riboflavine (mg)	0,07 (Poudre) 0,088 (Conc)	0,5
Niacine (mg)	0,7 (Poudre) 0,71 (Conc)	5,3

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g de poudre
Acide pantothénique (mg)	0,3 (Poudre) 0,34 (Conc)	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,04 (Poudre) 0,043 (Conc)	0,3
Acide folique (mg)	0,01 (Poudre) 0,0129 (Conc)	0,1
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,0015
Biotine (mg)	0,002	0,02
Choline (mg)	11 (Poudre) 16,2 (Conc)	80
Inositol (mg)	12 (Poudre) 12,2 (Conc)	90
Carnitine (mg)	-	-
Taurine (mg)	4 (Poudre) 3,5 (Conc)	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	16,6
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	n.d. (Poudre) 280 (Conc)
Osmolarité (mOsm/L)	n.d. (Poudre) 250 (Conc)
Eau (g/100 mL)	91 (Poudre) 90 (Conc)

- = n'en contient pas

n.d. = non disponible

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2].»

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Enfamil® 2	Poudre	900 g	6800 mL (29 bouteilles x 8 oz liq)	36 mois	1274013
	Concentré	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz liq)	15 mois	1015429

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui. Demandez au médecin de votre bébé s'il est nécessaire d'utiliser de l'eau bouillie et refroidie pour apprêter la préparation et de faire bouillir la mesure, les ustensiles, les biberons et les tétines propres avant de les utiliser.

1. Lavez bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. Verser la quantité d'eau dans la bouteille. Ajouter la poudre.	3. Recouvrir la bouteille de son couvercle et **BIEN AGITER.**

Utiliser le tableau ci-dessous pour les proportions indiquées d'eau et de poudre. Utiliser la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conserver la mesure **SÈCHE** dans cette boîte.

Pour obtenir	Eau	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

CONCENTRÉ

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utiliser selon les instructions de votre médecin.

1. Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon avant d'apprêter la préparation.	2. Nettoyez le dessus de la boîte, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Versez la quantité d'eau appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité **égale** de liquide concentré. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN.**

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

Eau Enfamil®

Eau pour voie orale seulement.

Ⓤ Ingrédients parèves; installations laitières utilisées

INDICATIONS

Eau pour voie orale seulement.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Eau Enfamil®	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1215250

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

MODE D'EMPLOI

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement d'aliments pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. Retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Après ouverture, servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer l'eau, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser pour l'alimentation parentérale (intraveineuse).

Cette eau est prête à consommer comme eau de boisson ou à d'autres fins orales selon les instructions de votre médecin.

Conservation: Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

Eau Glucosée à 5% Enfamil®

Eau glucosée à 5%.
Pour voie orale seulement.

Ⓤ **Ingrédients parèves; installations laitières utilisées**

INDICATIONS

Eau glucosée à 5%. Pour voie orale seulement.

NUTRIMENTS

Valeur nutritive	Par Biberon Nursette® (59 mL)
Calories	10
Lipides	0 g
Glucides	3 g
Sucres	3 g
Protéines	0 g
Source : négligeable de sodium, de fibres, de vitamines A et C, de calcium et de fer.	

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Eau Glucosée à 5% Enfamil®	Biberon Nursette®	59 mL	59 mL (2 oz liq)	12 mois	1216351

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

MODE D'EMPLOI

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement d'aliments pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. Retirer le couvercle.	3. Fixer une **TÉTINE JETABLE** (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Après ouverture, servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer l'eau, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser pour l'alimentation parentérale (intraveineuse).

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.



Tout-Petits

Enfagrow A+®

Supplément nutritionnel à base de lait de vache conçu pour les tout-petits âgés de 12 à 36 mois.

Ⓤ D

INDICATIONS

Supplément nutritionnel à base de lait de vache conçu pour les tout-petits âgés de 12 à 36 mois. Renferme 23 vitamines et minéraux, y compris des taux de calcium et de fer adaptés à l'âge, ainsi que de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose).

NUTRIMENTS

Analyse	par portion de 200 mL reconstituée (36 g ou 3 mesures rases de poudre non tassée)	Teneur par portion (Prête à boire)
Calories (kcal/kJ)	160 / 670	160/670
Protéines (g)	6,4	6,4
Matières grasses (g)	6,3	5,2
Acide linoléique (g)	0,9	0,8
Acide linolénique (g)	0,1	0,1
Acides lipides saturés (g)	2,6	2,1
ADH (mg)	26	26
Glucides (g)	20	22
Galacto-oligosaccharides (g)	0,4	0,4
Polydextrose (g)	0,4	0,4
Sodium (mg)	80	80
Potassium (mg)	300	300
Vitamine A (ÉR)	250	177
Vitamine D (mg)	0,0009	0,0009
Vitamine E (mg)	1,81	1,81

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par portion de 200 mL reconstituée (36 g ou 3 mesures rases de poudre non tassée)	Teneur par portion (Prête à boire)
Vitamine C (mg)	10	10
Thiamine (mg)	0,3	0,3
Riboflavine (mg)	0,36	0,36
Niacine (ÉN)	5,8	5,4
Acide pantothénique (mg)	1,13	1,13
Vitamine B_6 (mg)	0,36	0,36
Folacine (mg)	0,057	0,057
Vitamine B_{12} (mg)	0,00032	0,0002
Biotine (mg)	0,03	0,03
Calcium (mg)	250	220
Phosphore (mg)	187	187
Magnésium (mg)	38	38
Fer (mg)	2,5	2,5
Zinc (mg)	2,6	2,6
Manganèse (mg)	0,86	0,86
Cuivre (mg)	0,3	0,3
Iode (mg)	0,04	0,04
Chlore (mg)	180	180

% de la valeur quotidienne		
	Enfants de moins de 2 ans	Enfants de 2 ans et plus
Calcium	50% (Poudre) 40% (Prête à boire)	25% (Poudre) 20% (Prête à boire)
Fer	35% (Poudre) 40% (Prête à boire)	20%

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Enfagrow A+® (vanille)	Poudre	680 g	19 x 200 mL	12 mois	2015852
	Prête à boire	237 mL	237 mL (1 bouteille x 8 oz liq)	12 mois	2033817
Enfagrow A+® (saveur de lait)	Poudre	680 g	19 x 200 mL	12 mois	2015854
	Prête à boire	237 mL	237 mL (1 bouteille x 8 oz liq)	12 mois	2033816

MODE D'EMPLOI

POUDRE

Enfagrow A+® est destiné aux enfants de 1 à 3 ans et n'est pas destiné aux enfants de moins d'un an.

1. Pour préparer 1 portion (200 mL), ajouter 3 mesures rases de poudre non tassée à 175 mL d'eau tiède.

2. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse.

3. Réfrigérer et utiliser dans les 48 heures.

Conservation : Après son ouverture, la boîte doit être bien couverte et conservée à la température de la pièce dans un endroit sec. Conserver la mesure **SÈCHE** dans cette boîte.

PRÊTE À BOIRE

Bien agiter avant d'ouvrir. Retirer le sceau protecteur autour du couvercle de la bouteille, retirer le couvercle et l'opercule en aluminium et servir. Réfrigérer après l'ouverture et utiliser dans les 48 heures.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer le produit, car celui-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

Médicale

Portagen®

Préparation à base de protéines de lait avec triglycérides à chaîne moyenne (TCM) destinée aux enfants et aux adultes.

Ⓤ D

INDICATIONS

Préparation à base de protéines de lait avec triglycérides à chaîne moyenne (TCM) destinée aux enfants et aux adultes.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	101/420	470/1970
Protéines (g)	3,7	17
% du total des calories	14	14
Source: Caséinate de sodium		
Glucides (g)	11,6	54
% du total des calories	46	46
Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre		
Matières grasses (g)	4,7	22
% du total des calories	40	40
Source: Huile TCM (87%), huile de maïs (13%)		
Acide linoléique (g)	0,28	1,3
Minéraux		
Calcium (mg)	95	440
Phosphore (mg)	71	330
Magnésium (mg)	21	96
Fer (mg)	1,89	8,8
Zinc (mg)	0,95	4,4
Manganèse (mg)	0,127	0,59
Cuivre (mg)	0,159	0,74
Iode (mg)	0,0071	0,033

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Sélénium (mg)	-	-
Sodium (mg)	52	240
Potassium (mg)	127	590
Chlorure (mg)	86	400
Vitamines		
Vitamine A (UI)	340	1560
Vitamine D (UI)	28	130
Vitamine E (UI)	1,59	7,4
Vitamine K (mg)	0,008	0,037
Vitamine C (mg)	3,9	18
Thiamine (mg)	0,08	0,37
Riboflavine (mg)	0,095	0,44
Niacine (mg)	1,05	4,9
Acide pantothénique (mg)	0,54	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,105	0,49
Acide folique (mg)	0,0101	0,047
Vitamine B_{12} (mg)	0,00032	0,0015
Biotine (mg)	0,0039	0,018
Choline (mg)	1,35	63
Inositol (mg)	nd	nd
Carnitine (mg)	2,9	13,3
Taurine (mg)	-	-

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	31
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	350
Osmolarité (mOsm/L)	300
Eau (g/100 mL)	87

– = n'en contient pas
nd = non indiquée

Portagen® devrait être utilisé seulement sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. S'il doit être utilisé à long terme, il faudrait envisager la prise de suppléments d'acides gras essentiels et de minéraux en ultratraces.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Portagen®	Poudre	410 g	2,1 L @ 30 kcal/30 mL	24 mois	2032499

MODE D'EMPLOI

UTILISER SELON LES INSTRUCTIONS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE DIÉTÉTISTE.

LA POUDRE PORTAGEN® N'EST PAS CONÇUE POUR SERVIR DE PRÉPARATION POUR NOURRISSONS. La poudre Portagen® est une source de protéines, lipides et glucides facile à digérer qui peut être servie en tant que supplément nutritif sous forme de breuvage.

La poudre Portagen® n'est pas conçue en tant que seule source nutritionnelle. Pour l'usage prolongé, un supplément d'acides gras essentiels et des minéraux à l'état d'ultra-trace devrait être considéré. N'utiliser que selon les directives de votre médecin.

MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé du consommateur en dépend. N'utiliser que selon les instructions d'un professionnel de la médecine. Une hygiène, une préparation, une dilution, un usage ou un entreposage inappropriés peuvent causer de sévères dommages. Les préparations alimentaires en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes possiblement immunodéprimés sauf si cela est prescrit et supervisé par un professionnel de la médecine.

- Pour 946 mL (32 oz liq. US) de produit apprêté, ajouter 1 2/3 tasses de poudre tassée à niveau (204 g) à 790 mL (27 oz liq. US) d'eau.*
- Pour approximativement 131 mL (4,5 oz liq. US) de produit apprêté, ajouter 3 mesures rases tassées (28,2 g) à 110 mL (3,5 oz liq. US) d'eau.*

- Les deux préparations fourniront 30 kcal / 30 mL de produit apprêté. Pour d'autres quantités, suivre les directives de votre médecin.
- Verser la quantité d'eau désirée dans un récipient approprié. Ajouter la poudre et mélanger vigoureusement jusqu'au mélange complet.

Le défaut de suivre ces instructions pourrait causer de sévères dommages. Une fois apprêté, le produit est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Bien agiter avant chaque usage. Le produit apprêté ne doit pas être utilisé s'il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. Ne pas congeler le produit apprêté. Ne pas réfrigérer le contenant après qu'il a été entamé. Le produit apprêté restant dans le contenant entamé doit être jeté dans un délai d'une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température de la pièce. Après son ouverture, la boîte doit être recouverte hermétiquement, conservée dans un endroit sec et utilisée dans un délai d'un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

*Les mesures en mL sont les plus précises pour ce qui est d'atteindre la densité calorique cible; les valeurs en oz liq. US sont des approximations et sont calculées à l'aide de facteurs de conversion américains.

Solution orale Enfamil® Enfalyte®

pour le maintien de l'équilibre électrolytique

Solution orale pour le maintien de l'équilibre électrolytique. Léger arôme de cerise.

Ⓤ Ingredients parèves; installations laitières utilisées

INDICATIONS

Solution orale pour le maintien de l'équilibre électrolytique. Favorise l'absorption liquidienne.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL
Calories (kcal/kJ)	12,6/53
Protéines (g)	0
Glucides (g)	3,2
% du total des calories	100
Source : Extraits secs de sirop de maïs (94 %), citrates (6 %)	
Matières grasses (g)	0
Électrolytes	
Sodium (mg) (mmol)	115 5
Potassium (mg) (mmol)	98 2,5
Chlorure (mg) (mmol)	160 4,5

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	12
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	200
Osmolarité (mOsm/L)	200
Eau (g/100 mL)	98

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Durée de conser-vation	N° d'article
Solution orale Enfamil® Enfalyte®	Biberon Nursette®	177 mL	12 mois	2021478

Métaboliques

Phenyl-Free® 1

Préparation sans phénylalanine, enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie (PCU).

INDICATIONS

Préparation sans phénylalanine, enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie (PCU).

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Équivalent protéique (g)	2,2	16,2
% du total des calories	13	13
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	6,9	51
% du total des calories	40	40
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre		
Matières grasses (g)	3,5	26
% du total des calories	47	47
Source: Oléine d'huile de palme (44%), huile de soya (19,5%), huile de noix de coco (19,5%), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5%), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5%)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,046	0,34
ARA (mg)	24	175
ADH (mg)	11,9	88
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	89 2,2	660 16,5
Phosphore (mg) (mmol)	59 1,92	440 14,2

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Magnésium (mg) (mmol)	8,9 0,37	66 2,7
Fer (mg)	1,3	9,6
Zinc (mg)	1,16	8,6
Manganèse (mg)	0,051	0,38
Cuivre (mg)	0,116	0,86
Iode (mg)	0,0103	0,076
Sélénium (mg)	0,0019	0,0141
Sodium (mg) (mmol)	32 1,41	240 10,4
Potassium (mg) (mmol)	76 1,93	560 14,3
Chlorure (mg) (mmol)	58 1,64	430 12,1
Vitamines		
Vitamine A (UI)	210	1520
Vitamine D (UI)	51	380
Vitamine E (UI)	1,35	10
Vitamine K (mg)	0,0054	0,044
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,135	1
Riboflavine (mg)	0,135	1
Niacine (mg)	1,35	10
Acide pantothénique (mg)	0,51	3,8
Vitamine B_6 (mg)	0,135	1
Acide folique (mg)	0,0135	0,1
Vitamine B_{12} (mg)	0,00027	0,002
Biotine (mg)	0,0051	0,038
Choline (mg)	16,7	124
Inositol (mg)	11,6	86
Carnitine (mg)	6,9	51
Taurine (mg)	4,1	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	19,5
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	350
Osmolarité (mOsm/L)*	320
Eau (g/100 mL)	90

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés sous la supervision directe et constante d'un médecin ou d'un diététiste spécialisé en troubles métaboliques.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de prendre suffisamment de phénylalanine en consommant aussi d'autres aliments qui contiennent cet acide aminé en fonction des besoins. Les préparations en poudre ne sont pas stériles.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Phenyl-Free® 1	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	18 mois	2001922

MODE D'EMPLOI

La préparation **Phenyl-Free® 1 de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de fournir suffisamment de phénylalanine en offrant aussi des aliments qui contiennent cet acide aminé, selon les besoins. Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et constamment l'emploi de Phenyl-Free® 1 avec d'autres aliments et liquides et ajuster l'alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation qui s'imposent au moment d'apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin qui s'occupe de votre bébé.

1. Laver bien les mains. Faire bouillir les bouteilles, tétines, bagues et ustensiles dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faire bouillir de l'eau fraîche à forte ébullition pour 2 minutes. Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mélanger.	3. Verser la quantité désirée d'eau refroidie dans la bouteille. Ajouter la poudre. Recouvrir la bouteille de son couvercle et **BIEN AGITER.**

Le médecin qui s'occupe de votre bébé vous indiquera les quantités d'eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et agitez vigoureusement.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 4,5 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n'a pas été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

Phenyl-Free® 2

Préparation en poudre sans phénylalanine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

INDICATIONS

Préparation en poudre sans phénylalanine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	410/1720
Protéines (g)	4,6	22
% du total des calories	22	22
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	12,4	60
% du total des calories	59	59
Source: Sucre, extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	1,78	8,6
% du total des calories	19	19
Source: Huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,87	4,2
Acide linolénique (g)	0,108	0,52
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	151 3,8	730 18,2
Phosphore (mg) (mmol)	151 4,9	730 24
Magnésium (mg) (mmol)	34 1,39	163 6,7
Fer (mg)	2,5	12,2
Zinc (mg)	2,5	12,2

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Manganèse (mg)	0,27	1,31
Cuivre (mg)	0,25	1,22
Iode (mg)	0,013	0,063
Sélénium (mg)	0,006	0,029
Sodium (mg) (mmol)	126 5,5	610 27
Potassium (mg) (mmol)	230 5,8	1100 28
Chlorure (mg) (mmol)	178 5	860 24
Vitamines		
Vitamine A (UI)	300	1430
Vitamine D (UI)	60	290
Vitamine E (UI)	2	9,8
Vitamine K (mg)	0,0085	0,041
Vitamine C (mg)	10,1	49
Thiamine (mg)	0,25	1,22
Riboflavine (mg)	0,2	0,98
Niacine (mg)	4,6	22
Acide pantothénique (mg)	1,01	4,9
Vitamine B_6 (mg)	0,2	0,98
Acide folique (mg)	0,072	0,35
Vitamine B_{12} (mg)	0,0005	0,0024
Biotine (mg)	0,0101	0,049
Choline (mg)	20	98
Inositol (mg)	10,1	49
Carnitine (mg)	10,1	49
Taurine (mg)	10,1	49

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	47
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	920
Osmolarité (mOsm/L)*	790
Eau (g/100 mL)	86

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu'elles ne contiennent pas de phénylalanine, un acide aminé essentiel.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Phenyl-Free® 2	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 mois	1281335

MODE D'EMPLOI

La préparation **Phenyl-Free® 2 de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter Phenyl-Free® 2 avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir suffisamment de phénylalanine pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **Phenyl-Free® 2. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 14,4 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

Phenyl-Free® 2 HP

Préparation en poudre riche en protéines et sans phénylalanine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

INDICATIONS

Préparation en poudre riche en protéines et sans phénylalanine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	390/1630
Protéines (g)	8,6	40
% du total des calories	41	41
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	9,5	44
% du total des calories	44	44
Source: Sucre, extraits secs de sirop de maïs, mélange d'acides aminés, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	1,36	6,3
% du total des calories	15	15
Source: Huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,65	3
Acide linolénique (g)	0,082	0,38
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	210 5,3	980 24
Phosphore (mg) (mmol)	210 6,8	980 32
Magnésium (mg) (mmol)	63 2,6	290 11,9
Fer (mg)	3,4	15,7
Zinc (mg)	3,4	15,7

Centre de renseignements aux hôpitaux: 1 800 263-1143
Bureau des commandes: 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Manganèse (mg)	0,34	1,57
Cuivre (mg)	0,34	1,57
Iode (mg)	0,0108	0,05
Sélénium (mg)	0,0078	0,036
Sodium (mg) (mmol)	89 3,9	410 17,8
Potassium (mg) (mmol)	250 6,5	1180 30
Chlorure (mg) (mmol)	210 6	980 28
Vitamines		
Vitamine A (UI)	420	1960
Vitamine D (UI)	84	390
Vitamine E (UI)	2,5	11,8
Vitamine K (mg)	0,011	0,051
Vitamine C (mg)	13,6	63
Thiamine (mg)	0,34	1,57
Riboflavine (mg)	0,28	1,29
Niacine (mg)	6,3	29
Acide pantothénique (mg)	1,36	6,3
Vitamine B_6 (mg)	0,28	1,29
Acide folique (mg)	0,102	0,47
Vitamine B_{12} (mg)	0,00067	0,0031
Biotine (mg)	0,0136	0,063
Choline (mg)	14,5	67
Inositol (mg)	13,6	63
Carnitine (mg)	7,8	36
Taurine (mg)	13,6	63

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	72
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	1240
Osmolarité (mOsm/L)*	1070
Eau (g/100 mL)	86

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu'elles ne contiennent pas de phénylalanine, un acide aminé essentiel.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Phenyl-Free® 2 HP	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 mois	1281334

MODE D'EMPLOI

La préparation **Phenyl-Free® 2 HP de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter Phenyl-Free® 2HP avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir suffisamment de phénylalanine pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **Phenyl-Free® 2 HP. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 15,1 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois.

Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

TYROS 1

Préparation sans tyrosine ni phénylalanine et enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de tyrosinémie de type I et de type II.

INDICATIONS

Préparation sans tyrosine ni phénylalanine et enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de tyrosinémie de type I et de type II.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Équivalent protéique (g)	2,3	16,7
% du total des calories	13	13
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	6,9	51
% du total des calories	40	40
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre		
Matières grasses (g)	3,5	26
% du total des calories	47	47
Source: Oléine d'huile de palme (44%), huile de soya (19,5%), huile de noix de coco (19,5%), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5%), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5%)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,046	0,34
ARA (mg)	24	175
ADH (mg)	11,9	88
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	89 2,2	660 16,5

Centre de renseignements aux hôpitaux: 1 800 263-1143
Bureau des commandes: 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Phosphore (mg) (mmol)	59 1,92	440 14,2
Magnésium (mg) (mmol)	8,9 0,37	66 2,7
Fer (mg)	1,3	9,6
Zinc (mg)	1,16	8,6
Manganèse (mg)	0,051	0,38
Cuivre (mg)	0,116	0,86
Iode (mg)	0,0103	0,076
Sélénium (mg)	0,0019	0,0141
Sodium (mg) (mmol)	32 1,41	240 10,4
Potassium (mg) (mmol)	82 2,1	610 15,6
Chlorure (mg) (mmol)	58 1,64	430 12,1
Vitamines		
Vitamine A (UI)	210	1520
Vitamine D (UI)	51	380
Vitamine E (UI)	1,35	10
Vitamine K (mg)	0,0054	0,044
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,135	1
Riboflavine (mg)	0,135	1
Niacine (mg)	1,35	10
Acide pantothénique (mg)	0,51	3,8
Vitamine B_6 (mg)	0,135	1
Acide folique (mg)	0,0135	0,1
Vitamine B_{12} (mg)	0,00027	0,002
Biotine (mg)	0,0051	0,038
Choline (mg)	16,7	124
Inositol (mg)	11,6	86
Carnitine (mg)	6,8	50
Taurine (mg)	4,1	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	20
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	360
Osmolarité (mOsm/L)*	320
Eau (g/100 mL)	90

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés sous la supervision directe et constante d'un médecin ou d'un diététiste spécialisé en troubles métaboliques.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de prendre suffisamment de phénylalanine et de tyrosine en mangeant aussi des aliments qui en contiennent.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
TYROS 1	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	18 mois	2001957

MODE D'EMPLOI

La préparation **TYROS 1 de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants atteints de tyrosinémie, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de fournir suffisamment de phénylalanine et de tyrosine en offrant aussi des aliments qui contiennent ces acides aminés, selon les besoins. Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et constamment l'emploi de TYROS 1 avec d'autres aliments et liquides et ajuster l'alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation qui s'imposent au moment d'apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin qui s'occupe de votre bébé.

1. Laver bien les mains. Faire bouillir les bouteilles, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faire bouillir de l'eau fraîche à forte ébullition pour 2 minutes. Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mélanger.	3. Verser la quantité désirée d'eau refroidie dans la bouteille. Ajouter la poudre. Recouvrir la bouteille de son couvercle et l'agiter vigoureusement.

Le médecin qui s'occupe de votre bébé vous indiquera les quantités d'eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et agitez vigoureusement.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 4,5 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n'a pas été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE: Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

TYROS 2

Préparation en poudre sans phénylalanine ni tyrosine pour l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de troubles héréditaires du métabolisme de la tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II.

INDICATIONS

Préparation en poudre sans phénylalanine ni tyrosine pour l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de troubles héréditaires du métabolisme de la tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	410/1720
Équivalent protéique (g)	4,6	22
% du total des calories	22	22
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	12,5	60
% du total des calories	59	59
Source : Extraits secs de sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	1,77	8,5
% du total des calories	19	19
Source: huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,87	4,2
Acide linolénique (g)	0,108	0,52
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	152 3,8	730 18,2
Phosphore (mg) (mmol)	152 4,9	730 24
Magnésium (mg) (mmol)	34 1,4	163 6,7
Fer (mg)	2,5	12,2
Zinc (mg)	2,5	12,2

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Manganèse (mg)	0,27	1,3
Cuivre (mg)	0,25	1,22
Iode (mg)	0,0131	0,063
Sélénium (mg)	0,0058	0,028
Sodium (mg) (mmol)	127 5,5	610 27
Potassium (mg) (mmol)	230 5,9	1100 28
Chlorure (mg) (mmol)	177 5,0	850 24
Vitamines		
Vitamine A (UI)	300	1420
Vitamine D (UI)	58	280
Vitamine E (UI)	2	9,8
Vitamine K (mg)	0,0085	0,041
Vitamine C (mg)	10,2	49
Thiamine (mg)	0,25	1,22
Riboflavine (mg)	0,2	0,98
Niacine (mg)	4,6	22
Acide pantothénique (mg)	1,02	4,9
Vitamine B_6 (mg)	0,2	0,98
Acide folique (mg)	0,073	0,35
Vitamine B_{12} (mg)	0,0005	0,0024
Biotine (mg)	0,0102	0,049
Choline (mg)	20	98
Inositol (mg)	10,2	49
Carnitine (mg)	10,2	49
Taurine (mg)	10,2	49

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	48
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	830
Osmolarité (mOsm/L)*	710
Eau (g/100 mL)	86

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu'elles ne contiennent pas de tyrosine ni de phénylalanine, des acides aminés essentiels.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
TYROS 2	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 mois	1281396

MODE D'EMPLOI

La préparation **TYROS 2 de Mead Johnson Nutrition** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme de la tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter TYROS 2 avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir suffisamment de tyrosine et de phénylalanine pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **TYROS 2. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 14,5 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

BCAD 1

Préparation sans isoleucine, leucine ni valine et enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable.

INDICATIONS

Préparation sans isoleucine, leucine ni valine et enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Équivalent protéique (g)	2,2	16,2
% du total des calories	13	13
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	6,9	51
% du total des calories	40	40
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre		
Matières grasses (g)	3,5	26
% du total des calories	47	47
Source: Oléine d'huile de palme (44%), huile de soya (19,5%), huile de noix de coco (19,5%), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5%), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5%)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,046	0,34
ARA (mg)	24	175
ADH (mg)	11,9	88
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	89 2,2	660 16,5

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Phosphore (mg) (mmol)	59 1,92	440 14,2
Magnésium (mg) (mmol)	8,9 0,37	66 2,7
Fer (mg)	1,3	9,6
Zinc (mg)	1,16	8,6
Manganèse (mg)	0,051	0,38
Cuivre (mg)	0,116	0,86
Iode (mg)	0,0103	0,076
Sélénium (mg)	0,0019	0,0141
Sodium (mg) (mmol)	32 1,41	240 10,4
Potassium (mg) (mmol)	81 2,1	600 15,3
Chlorure (mg) (mmol)	68 1,9	500 14,1
Vitamines		
Vitamine A (UI)	210	1520
Vitamine D (UI)	51	380
Vitamine E (UI)	1,35	10
Vitamine K (mg)	0,0054	0,044
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,135	1
Riboflavine (mg)	0,135	1
Niacine (mg)	1,35	10
Acide pantothénique (mg)	0,51	3,8
Vitamine B_6 (mg)	0,135	1
Acide folique (mg)	0,0135	0,1
Vitamine B_{12} (mg)	0,00027	0,002
Biotine (mg)	0,0051	0,038
Choline (mg)	16,7	124
Inositol (mg)	11,6	86
Carnitine (mg)	6,8	50
Taurine (mg)	4,1	30

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	20
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	330
Osmolarité (mOsm/L)*	300
Eau (g/100 mL)	90

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés sous la supervision directe et constante d'un médecin ou d'un diététiste spécialisé en troubles métaboliques.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de prendre suffisamment d'isoleucine, de leucine et de valine en mangeant aussi des aliments qui contiennent de ces acides aminés.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999;134:11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
BCAD 1	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	18 mois	2001952

MODE D'EMPLOI

La préparation **BCAD 1 de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE: Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de fournir suffisamment d'isoleucine, de leucine et de valine en offrant aussi des aliments qui contiennent ces acides aminés, selon les besoins. Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et constamment l'emploi de BCAD 1 avec d'autres aliments et liquides et ajuster l'alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation qui s'imposent au moment d'apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin qui s'occupe de votre bébé.

1. Laver bien les mains. Faire bouillir les bouteilles, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faire bouillir de l'eau fraîche à forte ébullition pour 2 minutes. Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mélanger.	3. Verser la quantité désirée d'eau refroidie dans la bouteille. Ajouter la poudre. Recouvrir la bouteille de son couvercle et l'agiter vigoureusement.

Le médecin qui s'occupe de votre bébé vous indiquera les quantités d'eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et agitez vigoureusement.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 4,5 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n'a pas été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

BCAD 2

Préparation en poudre sans isoleucine, leucine ni valine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable ou d'autres troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.

INDICATIONS

Préparation en poudre sans isoleucine, leucine ni valine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable ou d'autres troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	410/1720
Équivalent protéique, g	5	24
% du total des calories	24	24
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	11,9	57
% du total des calories	57	57
Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	1,77	8,5
% du total des calories	19	19
Source: huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,87	4,2
Acide linolénique (g)	0,108	0,52
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	152 3,8	730 18,2
Phosphore (mg) (mmol)	152 4,9	730 24

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Magnésium (mg) (mmol)	34 1,39	163 6,7
Fer (mg)	2,5	12,2
Zinc (mg)	2,5	12,2
Manganèse (mg)	0,27	1,3
Cuivre (mg)	0,25	1,22
Iode (mg)	0,0131	0,063
Sélénium (mg)	0,0058	0,028
Sodium (mg) (mmol)	127 5,5	610 27
Potassium (mg) (mmol)	250 6,5	1220 31
Chlorure (mg) (mmol)	210 6	1020 29
Vitamines		
Vitamine A (UI)	360	1730
Vitamine D (UI)	73	350
Vitamine E (UI)	2,4	11,4
Vitamine K (mg)	0,0098	0,047
Vitamine C (mg)	11,9	57
Thiamine (mg)	0,3	1,42
Riboflavine (mg)	0,24	1,14
Niacine (mg)	5,4	26
Acide pantothénique (mg)	1,19	5,7
Vitamine B_6 (mg)	0,24	1,14
Acide folique (mg)	0,085	0,41
Vitamine B_{12} (mg)	0,00058	0,0028
Biotine (mg)	0,0119	0,057
Choline (mg)	20	98
Inositol (mg)	11,9	57
Carnitine (mg)	10,2	49
Taurine (mg)	11,9	57

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	51
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	900
Osmolarité (mOsm/L)*	780
Eau (g/100 mL)	86

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.
Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE: Les protéines sont incomplètes du fait qu'elles ne contiennent pas d'isoleucine, de leucine ni de valine, des acides aminés essentiels.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

*Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
BCAD 2	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 mois	1281386

MODE D'EMPLOI

La préparation **BCAD 2 de Mead Johnson Nutrition** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable ou d'autres troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE: Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter BCAD 2 avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir suffisamment d'isoleucine, de leucine et de valine pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **BCAD 2. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 14,5 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois.

Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).



PFD 1

Préparation sans protéines ni acides aminés* enrichie de vitamines, de minéraux et d'acides gras essentiels avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés.

*** Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé qui n'est pas un constituant des protéines.**

INDICATIONS

Préparation sans protéines ni acides aminés* enrichie de vitamines, de minéraux et d'acides gras essentiels avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés

*Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé qui n'est pas un constituant des protéines.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	69/290	530/2220
Protéines (g)	0	0
% du total des calories	0	0
Source: Non disponible		
Glucides (g)	7,8	60
% du total des calories	46	46
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre		
Matières grasses (g)	4,2	32
% du total des calories	54	54
Source: Oléine d'huile de palme (44%), huile de soya (19,5%), huile de noix de coco (19,5%), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5%), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5%)		
Acide linoléique (g)	0,64	4,9
Acide linolénique (g)	0,052	0,4

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
ARA (mg)	25	190
ADH (mg)	12,4	95
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	103 2,6	790 20
Phosphore (mg) (mmol)	69 2,2	530 17,1
Magnésium (mg) (mmol)	10,3 0,42	79 3,3
Fer (mg)	1,37	10,5
Zinc (mg)	1,37	10,5
Manganèse (mg)	0,061	0,47
Cuivre (mg)	0,137	1,05
Iode (mg)	0,0117	0,09
Sélénium (mg)	0,0021	0,0158
Sodium (mg) (mmol)	36 1,58	280 12,2
Potassium (mg) (mmol)	90 2,3	690 17,6
Chlorure (mg) (mmol)	69 1,94	530 14,9
Vitamines		
Vitamine A (UI)	240	1840
Vitamine D (UI)	59	450
Vitamine E (UI)	1,72	13,2
Vitamine K (mg)	0,0069	0,053
Vitamine C (mg)	9,6	74
Thiamine (mg)	0,172	1,32
Riboflavine (mg)	0,157	1,21
Niacine (mg)	1,57	12,1
Acide pantothénique (mg)	0,6	4,6
Vitamine B_6 (mg)	0,157	1,21
Acide folique (mg)	0,0172	1,32

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Vitamine B_{12} (mg)	0,00034	0,0026
Biotine (mg)	0,0061	0,047
Choline (mg)	17,6	135
Inositol (mg)	14,2	109
Carnitine (mg)	8,2	63
Taurine (mg)	4,8	37

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	8
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)†	171
Osmolarité (mOsm/L)†	154
Eau (g/100 mL)	90

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés sous la supervision directe et constante d'un médecin ou d'un diététiste spécialisé en troubles métaboliques.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de prendre suffisamment de protéines ou d'acides aminés en mangeant aussi des aliments qui contiennent des protéines.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy.*J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

†Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,69 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
PFD 1	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	18 mois	2001927

MODE D'EMPLOI

La préparation **PFD 1 de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de fournir suffisamment de protéines et d'acides aminés en offrant aussi des aliments qui contiennent des protéines, selon les besoins. Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et constamment l'emploi de PFD 1 avec d'autres aliments et liquides et ajuster l'alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation qui s'imposent au moment d'apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont pas stériles et **ne** devraient **pas** être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin qui s'occupe de votre bébé.

1. Laver bien les mains. Faire bouillir les bouteilles, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faire bouillir de l'eau fraîche à forte ébullition pour 2 minutes. Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mélanger.	3. Verser la quantité désirée d'eau refroidie dans la bouteille. Ajouter la poudre. Recouvrir la bouteille de son couvercle et l'agiter vigoureusement.

Le médecin qui s'occupe de votre bébé vous indiquera les quantités d'eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et agitez vigoureusement.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 4,5 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n'a pas été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

PFD 2

Préparation en poudre sans protéines ni acides aminés* destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) chez qui on a confirmé la présence de troubles du métabolisme des acides aminés.

***Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé qui n'est pas un constituant des protéines.**

INDICATIONS

Préparation en poudre sans protéines ni acides aminés* destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) chez qui on a confirmé la présence de troubles du métabolisme des acides aminés.

*Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé qui n'est pas un constituant des protéines.

NUTRIMENTS

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	400/1670
Equivalent protéique, g	0	0
% du total des calories	0	0
Source: Non disponible		
Glucides (g)	18,7	88
% du total des calories	89	89
Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre, fécule de maïs modifiée		
Matières grasses (g)	1,02	4,8
% du total des calories	11	11
Source: huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,49	2,3
Acide linolénique (g)	0,06	0,28
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	85 2,1	400 10
Phosphore (mg) (mmol)	85 2,7	400 12,9
Magnésium (mg) (mmol)	19,4 0,8	91 3,7

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Fer (mg)	1,34	6,3
Zinc (mg)	1,34	6,3
Manganèse (mg)	0,147	0,69
Cuivre (mg)	0,134	0,63
Iode (mg)	0,0075	0,035
Sélénium (mg)	0,003	0,0142
Sodium (mg) (mmol)	77 3,3	360 15,7
Potassium (mg) (mmol)	72 1,85	340 8,7
Chlorure (mg) (mmol)	68 1,92	320 9
Vitamines		
Vitamine A (UI)	168	790
Vitamine D (UI)	33	154
Vitamine E (UI)	1,09	5,1
Vitamine K (mg)	0,0047	0,022
Vitamine C (mg)	5,5	26
Thiamine (mg)	0,134	0,63
Riboflavine (mg)	0,109	0,51
Niacine (mg)	2,4	11,5
Acide pantothénique (mg)	0,55	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,109	0,51
Acide folique (mg)	0,038	0,178
Vitamine B_{12} (mg)	0,00025	0,00119
Biotine (mg)	0,0055	0,026
Choline (mg)	10,9	51
Inositol (mg)	5,5	26
Carnitine (mg)	5,5	26
Taurine (mg)	5,5	26

Autres caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	9,8
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)†	450
Osmolarité (mOsm/L)†	380
Eau (g/100 mL)	86

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel du fait qu'il ne contient pas de protéines ni d'acides aminés.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134 : 11-14.

†Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
PFD 2	Poudre	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 mois	1281389

MODE D'EMPLOI

La préparation **PFD 2 de Mead Johnson Nutrition** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de troubles du métabolisme des acides aminés, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter PFD 2 avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **PFD 2. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 14,9 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

Vitamines

Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide)

Supplément de vitamine D

Supplément de vitamine D pour tous les nourrissons allaités nés à terme.

Ⓤ D

NPN 00762881

INDICATIONS

Supplément de vitamine D pour tous les nourrissons allaités nés à terme. Le liquide Enfamil® D-Vi-Sol® fournit aux nourrissons allaités de la vitamine D, qui joue un rôle dans la formation normale et la santé des os et des dents. Contribue à prévenir une carence en vitamine D.

Dans un énoncé conjoint, Santé Canada, la Société canadienne de pédiatrie et les Diététistes du Canada déclarent que la prise quotidienne d'un supplément de 10 µg (400 UI) de vitamine D est recommandée chez les nourrissons qui sont allaités exclusivement ou partiellement au sein, à partir de la naissance jusqu'à l'âge d'un an.

BIEN-FONDÉ ET CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Le liquide D-Vi-Sol fournit 400 UI de vitamine D pour répondre à l'apport quotidien recommandé. Il ne contient ni sucre, ni gluten, ni lactose.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Posologie quotidienne pour tous les nourrissons allaités nés à terme : 1 mL (remplir la seringue jusqu'au repère de 1,0 mL). Administrer lentement dans la bouche de l'enfant, vers l'intérieur de la joue.

Il est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d'autres aliments. La dose doit alors être administrée en une heure.

Ingrédients médicinaux (par 1 mL)		
Vitamine D_3	(cholécalciférol)	400 UI (10 µg)

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX

Glycérine, polysorbate 80, caramel, acide citrique anhydre, citrate de sodium dihydraté, hydroxyde de sodium, arôme artificiel et eau purifiée.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

PRÉCAUTIONS

Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

RÉFÉRENCES

1. Santé Canada, de la Société canadienne de pédiatrie, des Diététistes du Canada et du Comité canadien pour l'allaitement. La nutrition du nourrisson né à terme et en santé : Recommandations de la naissance à six mois.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil® D-Vi-Sol®	Liquide	50 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	18 mois	1015277

Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquide)

Supplément multivitaminique de vitamine A, D et C

Un supplément de vitamines A, D et C conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.

Ⓤ D

NPN 00762903

INDICATIONS

Un supplément de vitamines A, D et C conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.

BIEN-FONDÉ ET CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Le supplément multivitaminique Enfamil® Tri-Vi-Sol® en liquide fournit 3 vitamines fréquemment prescrites, en quantités qui conviennent à l'administration quotidienne à des nourrissons et à des tout-petits.

Le supplément multivitaminique Enfamil® Tri-Vi-Sol® en liquide contient ni lactose ni gluten et est exempte d'édulcorant artificiel.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Posologie quotidienne : 1 mL (remplir la seringue jusqu'au repère de 1,0 mL). Administrer lentement dans la bouche de l'enfant, vers l'intérieur de la joue.

Il est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d'autres aliments. La dose doit alors être administrée en une heure.

Ingrédients médicinaux (par 1mL)	
vitamine C (acide ascorbique)	30 mg
vitamine A (palmitate de vitamine A)	750 UI (225 mcg d'EAR)
vitamine D_3 (cholécalciférol)	400 UI (10 mcg)

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX

Glycérine, polysorbate 80, caramel, acide citrique anhydre, citrate de sodium dihydraté, hydroxyde de sodium, arôme artificiel et eau purifiée.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

PRÉCAUTIONS

Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Enfamil® Tri-Vi-Sol®	Liquide	50 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	15 mois	1015245

Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide)

Supplément multivitaminique

Un supplément multivitaminique conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.

Ⓤ D

NPN 00762946

INDICATIONS

Un supplément multivitaminique conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.

BIEN-FONDÉ ET CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Le supplément multivitaminique Enfamil Poly-Vi-Sol en liquide fournit 6 vitamines importantes et est indiqué lors de la transition de votre enfant ou votre tout-petits vers les aliments solides, pendant les poussées de croissance et chez l'enfant qui est difficile pour la nourriture.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Posologie quotidienne : 1 mL (remplir la seringue jusqu'au repère de 1,0 mL). Administrer lentement dans la bouche de l'enfant, vers l'intérieur de la joue.

Il est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d'autres aliments. La dose doit alors être administrée en une heure.

Ingrédients médicinaux (par 1 mL)	
Vitamin C (acide ascorbique)	30 mg
Niacinamide (niacinamide)	4 mg
Riboflavine (riboflavine-5-phosphate de sodium)	0,6 mg
Thiamine (chlorhydrate de thiamine)	0,5 mg
Vitamine A (palmitate de vitamine A)	750 UI (225 mcg d'EAR)
Vitamine D_3 (cholécalciférol)	400 UI (10 mcg)

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX

Glycérine, eau purifiée, polysorbate 80, colorant caramel et arômes de fruits.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

PRECAUTIONS

Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants.

Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conser-vation	N° d'article
Enfamil® Poly-Vi-Sol®	Liquide	50 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	15 mois	1015280

Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide)

Sulfate de fer, solution orale, U.S.P.

Aide à prévenir une carence en fer.

Ⓤ D

NPN 00762954

INDICATIONS

Aide à prévenir une carence en fer.

NUTRIMENTS

Les gouttes vitaminiques Fer-In-Sol contiennent par 1,0 mL	
Fer (sulfate ferreux heptahydraté)	75 mg
Équivalant à: en fer élémentaire	15 mg

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Utilisez selon les directives du médicin de votre bébé. Pour administration orale.

Posologie: Pour les enfants de 0 à 2 ans. Prendre avec de la nourriture. Attendre quelques heures avant d'administrer ou après avoir administré un autre médicament. Administrer lentement dans la bouche de l'enfant, vers l'intérieur de la joue.

Dose tonique: De 0,5 à 1 mL par jour ou selon les directives de votre médecin.

Dose thérapeutique: 2,5 mL par jour ou selon les directives de votre médecin. Diviser en trois (3) doses et administrer trois (3) fois par jour.

Mises en garde et précautions:

À la dose thérapeutique,certains enfants peuvent présenter de la constipation, de la diarrhée ou des vomissements. La décoloration temporaire des dents causée par ce liquide de fer peut être réduite à l'aide d'un bon brossage. Le liquide vitaminique Enfamil® Fer-in-Sol® est généralement incolore, mais sa couleur peut varier, allant du vert bleuté à une couleur dorée. Toute couleur se situant dans cette gamme ne modifie pas l'activité du produit. Conserver à la température ambiante entre 15 et 30°C (59 à 86°F).

Centre de renseignements aux hôpitaux: 1 800 263-1143
Bureau des commandes: 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX

Arôme naturel, acide citrique anhydre, alcool éthylique, bisulfite de sodium, solution de sorbitol, sucre et eau purifiée.

EFFETS SECONDAIRES

La prise de fer peut faire foncer les selles. Cet effet est normal et n'est pas préoccupant. Le liquide de fer peuvent noircir les dents des bébés, mais le bicarbonate de soude remédie à cette réaction inoffensive.

PRÉCAUTIONS

Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé. Pour voie orale seulement. Conservez ce produit et tous les médicaments hors de la portée des enfants. Cet emballage renferme suffisamment de médicament pour avoir des effets nocifs graves chez un enfant. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Certaines personnes peuvent présenter de la constipation, de la diarrhée ou des vomissements.

SURDOSAGE OU INGESTION ACCIDENTELS

En cas de surdosage accidentel, avertissez immédiatement le médecin, un centre antipoison ou le service des urgences d'un hôpital.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil® Fer-In-Sol®	Liquide	50 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	24 mois	1015154

Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop)

Sulfate de fer, solution orale, U.S.P.

Aide à prévenir une carence en fer.

Ⓤ D

NPN 00017884

INDICATIONS

Aide à prévenir une carence en fer. Le sirop Enfamil® Fer-In-Sol® est une préparation aux arômes de fruits sans alcool, sans lactose ni gluten.

NUTRIMENTS

Le sirop vitaminique Fer-In-Sol® contient	Par 5,0 mL
Fer (sulfate ferreux heptahydraté)	150 mg
Équivalence en fer élémentaire	30 mg

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Prendre quelques heures avant ou après la prise d'autre médicaments. Mélanger avec de l'eau ou du jus de fruits et prendre avec les repas.

Supplément	
Administrer une fois par jour, ou selon les directives de votre médecin.	
0 à 6 ans	1,25 mL
6 à 12 ans	2,5 mL
Adultes	5 mL

Carence	
Diviser en trois (3) doses et administrer trois (3) fois par jour, ou selon les directives de votre médecin.	
0 à 2 ans	2,5 à 5 mL
2 à 6 ans	5 mL
6 à 12 ans	5 à 12 mL
Adultes	10 à 15 mL

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX

Sucrose, solution de sorbitol, arôme naturel et artificiel, acide citrique anhydre, chlorure de sodium, bisulfite de sodium, acide sulfurique et eau purifiée.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

PRÉCAUTIONS

Conservez ce produit et tous les médicaments hors de la portée des enfants. Cet emballage renferme suffisamment de médicament pour avoir des effets nocifs graves chez un enfant. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Certaines personnes pourraient souffrir de constipation, de diarrhée ou de vomissements. Le noircissement temporaire des dents causé par le sirop de fer peut être réduit au minimum par un brossage minutieux.

SURDOSAGE OU INGESTION ACCIDENTELS

En cas de surdosage accidentel, avertissez immédiatement le médecin, un centre antipoison ou le service des urgences d'un hôpital.

FORMATS DISPONIBLES

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de conservation	N° d'article
Enfamil® Fer-In-Sol®	Sirop	250 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	24 mois	1015278

Accessoires

Tétines Enfamil® et sucettes

Les tétines Enfamil® sont conçues pour être utilisées avec les biberons Nursette®. Il existe quatre tétines différentes pour satisfaire les diverses préférences des nourrissons, des parents et des professionnels de la santé. Elles sont toutes prêtes à l'emploi et jetables. Chaque caisse contient 240 tétines. Les tétines Enfamil® sont faites de plastique chirurgical et sont exemptes de latex. Les tétines et sucettes NUK®, quant à elles, contiennent du latex.

Tétine Enfamil® Souple à Débit Standard
N° d'article 1208370 - 240 par caisse

Tétine souple à débit standard et à orifice unique (0,014 po) conçue pour les préparations courantes.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Plastique chirurgical (TPE)	N	N	N	N

Tétine Enfamil® Souple à Débit Lent
N° d'article 1208371 - 240 par caisse

Tétine souple à débit lent et à orifice unique (0,014 po) conçue pour les situations où un débit plus lent est souhaité. Généralement utilisée par les nourrissons prématurés ou par ceux qui ont des besoins particuliers.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Plastique chirurgical (TPE)	N	N	N	N

Tétine Enfamil® Souple à Débit Très Lent
N° d'article 2035942 - 240 par caisse

Tétine souple à débit très lent, dotée d'un orifice unique (0,009 po), est conçue pour les situations où l'on souhaite obtenir un débit encore plus lent que celui qu'offre la tétine Enfamil® souple à débit lent. Elle est généralement utilisée dans le cas des nourrissons prématurés ou de ceux qui ont des besoins particuliers.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Plastique chirurgical (TPE)	N	N	N	N

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Tétine Orthodontique pour Nouveau-né NUK®
N° d'article 1015473 - 240 par caisse

Sa forme est conçue pour ressembler au mamelon de la mère durant l'allaitement. Cette tétine **contient** du latex.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Caoutchouc latex	O	N	N	N

Sucette Orthodontique pour Nouveau-né NUK®
N° d'article 1015474 - 100 par caisse

Destinée aux nourrissons de moins de 4 mois.

Cette sucette **contient** du latex.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène (partie en plastique) Caoutchouc latex (tétine)	O	N	N	N

Information exacte en date du november 2012
NUK est une marque déposée de MAPA, Allemagne.
DEHP signifie phtalate de bis(2-éthylexyle) ou phtalate de dioctyle

Biberons

Mead Johnson distribue des biberons en plastique, des contenants Grad-U-Feed®, Snappies® pour la conservation du lait maternel et des biberons pour nourrissons présentant une fissure labio-palatine. Tous ces biberons sont prêts à l'emploi et jetables. Ils sont tous exempts de latex et de BPA.

Biberons en plastique prêts à l'emploi

N° d'article 1014765 - 48 par caisse

Biberon en plastique pratique pouvant contenir 240 mL (8 oz liq.) vendu avec une tétine Enfamil® souple à débit standard, une bague de tétine et un couvercle de tétine. Le biberon est fait de polypropylène et est exempt de latex.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Contenants Grad-U-Feed®

N° d'article 1014815 - 100 par caisse

Les contenants Grad-U-Feed® peuvent contenir 60 mL (2 oz liq.) et sont utilisés pour l'alimentation des nourrissons qui nécessitent une quantité inférieure à 60 mL dans les unités néonatales de soins intensifs. Le contenant Grad-U-Feed® n'est pas conçu pour la conservation du lait maternel. Les tétines ne sont pas offertes avec les contenants Grad-U-Feed®. Les tétines Enfamil® peuvent être utilisées. Chaque caisse contient 100 contenants Grad-U-Feed®.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Bouchons Grad-U-Feed®

N° d'article 2028743 - 200 par caisse

Ces bouchons en plastique blancs sont conçus pour être utilisés sur les contenants Grad-U-Feed®. Ils doivent être stérilisés avant usage et sont conçus pour être utilisés une seule fois. Chaque caisse contient 200 bouchons.®

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Contenant Snappies® pour la conservation du lait maternel

N° d'article 1233036 - 200 par caisse

Les contenants Snappies® sont des contenants de 70 mL (2,3 oz liq.) conçus pour recueillir, conserver et donner le lait maternel exprimé. Les contenants Snappies® sont conçus en un seul morceau. Le couvercle à charnière pratique est fixé au contenant Snappies® afin qu'il soit possible de l'ouvrir et de le fermer d'une seule main. Les biberons sont aseptiques et prêts à l'emploi. Les biberons peuvent supporter des températures de congélation aussi basses que -57°C (-70°F).

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Biberon pour nourrissons présentant une fissure labio-palatine

N° d'article 1015466 - 72 par caisse

Le biberon pour nourrissons présentant une fissure labio-palatine est un biberon pressable qui peut contenir 180 mL (6 oz liq.). Il est offert avec une tétine allongée conçue pour les nourrissons présentant une fissure labiopalatine. Chaque caisse contient 72 biberons pour nourrissons présentant une fissure labiopalatine. La tétine est faite de plastique chirurgical et est exempte de latex.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Contenant de 11 mL pour colostrum
N° d'article 2007218 - 100 par caisse

Les contenants de 11 mL pour colostrum sont conçus pour recueillir, conserver et congeler le colostrum exprimé manuellement. Les contenants sont aseptiques, étanches à l'air et prêts à l'emploi, et ils peuvent supporter des températures de congélation.

Composition du produit	Latex (O/N)	BPA (O/N)	PVC (O/N)	Phthalates (ou DEHP)
Polypropylène	N	N	N	N

Information exacte en date de Juin 2016

NUK est une marque déposée de MAPA, Allemagne.

DEHP signifie phtalate de bis(2-éthylexyle) ou phtalate de dioctyle

Tableaux de dilution et préparation

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.

Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson suivantes :

Enfamil A+®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	58 (2,0)	65 (2,2)
22	0,74	52 (1,8)	59 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	54 (1,8)
26	0,88	43 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	48 (1,6)
28	0,95	40 (1,3)	46 (1,6)
30	1,01	37 (1,2)	43 (1,5)

†Enfamil A+® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	65 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	59 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	54 (1,8)
26	0,88	44 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	48 (1,6)
28	0,95	40 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

†Enfamil® Plus faible en fer doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure d'Enfamil® Plus faible en fer fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	65 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	59 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	54 (1,8)
26	0,88	44 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	48 (1,6)
28	0,95	41 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

†Enfamil® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure d'Enfamil® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil A+® EnfaCare®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
22	0,74	57 (1,9)	65 (2,2)
24	0,81	52 (1,7)	59 (2,0)
26	0,88	47 (1,6)	55 (1,8)
27	0,91	45 (1,5)	53 (1,8)
28	0,95	43 (1,5)	51 (1,7)
30	1,01	40 (1,3)	47 (1,6)

†Enfamil® A+® EnfaCare® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® EnfaCare® fournit 48 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,3 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil A+® 2

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	67 (2,3)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,7)
28	0,95	41 (1,4)	48 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

†Enfamil A+® 2 doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® 2 fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil® 2

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	43 (1,4)	49 (1,7)
28	0,95	41 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	38 (1,3)	44 (1,5)

†Enfamil® 2 doit être préparée des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil® 2 fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil A+ Gentlease®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	55 (1,8)
26	0,88	44 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,6)
28	0,95	40 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

†Enfamil A+ Gentlease® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+ Gentlease® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	55 (1,9)

†Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment† doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment† fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau
†Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.

Enfamil A+® Soya

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,7)
28	0,95	41 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

†Enfamil A+® Soya doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® Soya fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Nutramigen® A+® avec LGG®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	67 (2,3)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,7)
28	0,95	41 (1,4)	48 (1,6)
30	1,01	38 (1,3)	44 (1,5)

†Nutramigen® A+® avec LGG® doit être préparée à partir des mesures rases, **tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Nutramigen® A+® avec LGG® fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Nutramigen® A+®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	67 (2,3)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,7)
28	0,95	41 (1,4)	48 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

†Nutramigen® A+® doit être préparée à partir des mesures rases, **tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Nutramigen® A+® fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

PURAMINO A+®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	30 (1,0)	33 (1,1)
22	0,74	27 (0,9)	30 (1,0)
24	0,81	24 (0,8)	28 (0,9)
26	0,88	22 (0,7)	26 (0,9)
27	0,91	21 (0,7)	25 (0,8)
28	0,95	20 (0,7)	24 (0,8)
30	1,01	19 (0,6)	22 (0,8)

†PURAMINO A+® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre PURAMINO A+® fournit 22 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 3 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Pregestimil® A+®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,6)
28	0,95	40 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,2)	44 (1,5)

†Pregestimil® A+® doit être préparée à partir des mesures rases, **tassées.**
‡Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Pregestimil A+® fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Renseignements sur les mesures des produits en poudre de Mead Johnson Nutrition

Poudres	Poids d'une mesure (grammes)	kcal/ mesure	Volume déplacé (mL/g de poudre)	kcal/g	Protéines (mg/100 g)
Enfamil A+®	8,8	44	0,76	5,1	10,6
Enfamil®	8,5	44	0,72	5,2	10,8
Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil®	8,5	44	0,73	5,2	10,8
Enfamil A+® Soya	8,8	45	0,77	5,1	12,7
Nutramigen® A+® avec LGG®	9*	45	0,76	5,0	13,9
Nutramigen® A+®	9*	45	0,77	5,0	13,9
PURAMINO A+®	4,5	22	0,77	5,0	13,9†
PURAMINO A+® JUNIOR	6,8	33	0,75	4,9	14†
Pregestimil® A+®	8,9*	45	0,78	5,0	14
Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment	8,9	44	0,76	5,0	12,4
Enfamil A+® EnfaCare®	9,8	48	0,76	4,9	13,8
Enfamil A+ Gentlease®	8,7	44	0,77	5,1	11,7
Enfamil® 2	8,9	45	0,72	5,0	13
Enfamil A+® 2	9	45	0,77	5,0	12,9

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Poudres	Poids d'une mesure (grammes)	kcal/ mesure	Volume déplacé (mL/g de poudre)	kcal/g	Protéines (mg/100 g)
Enfagrow A+® vanille & saveur de lait	12	53	0,74	4,4	17,8
Phenyl-Free® 1	4,5	23	0,76	5,0	16,2†
Phenyl-Free® 2	14,4	59	0,67	4,1	22†
Phenyl-Free® 2 HP	15,1	59	0,67	3,9	40†
BCAD 1	4,5	23	0,77	5,0	16,2†
BCAD 2	14,5	59	0,67	4,1	24†
PFD 1	4,5	24	0,78	5,3	0
PFD 2	14,9	59	0,65	4,0	0
TYROS 1	4,5	23	0,77	5,0	16,7†
TYROS 2	14,5	59	0,67	4,1	22†
Portagen®	9,4*	44	0,75	4,7	17

*Mesure rase tassée - toutes les autres mesures sont rases non tassées
†Équivalents protéiques

Quand la précision est essentielle, peser en grammes. Prendre note que la taille des mesures varie selon les produits. Utiliser la mesure fournie avec le produit pour obtenir la densité calorique désirée.

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour réduire le plus possible les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation. »[1]

1. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Dilution des préparations pour nourrissons liquides concentrées

Ces dilutions conviennent aux préparations concentrées de Mead Johnson suivantes:

Enfamil A+®, Enfamil®, Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil®, Enfamil A+® Sans lactose, Enfamil A+® 2 et Enfamil® 2

kcal désirées		mL (oz liq.) d'eau à ajouter à une boîte de 385 mL de liquide concentré	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.	par mL		
20	0,68	384 (13)	769 (26)
22	0,74	311 (10,5)	695 (23,5)
24	0,81	251 (8,5)	636 (21,5)
26	0,88	207 (7)	591 (20)
27	0,91	177 (6)	562 (19)
28	0,95	163 (5,5)	547 (18,5)
30	1,01	133 (4,5)	518 (17,5)

Chaque boîte de liquide concentré fournit 520 kcal
30 mL de liquide concentré non dilué fournissent 40 kcal

Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Pour les instructions concernant la préparation, l'utilisation et la conservation, veuillez consulter la page propre à chaque produit.

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Lignes directrices pour la préparation des biberons Nursette® ou de lait maternel

PRÉPARATION D'UN BIBERON DE LAIT MATERNEL OU NURSETTE® DE 59 mL - 20-30 kcal/30 mL

Ces conseils généraux sont fournis pour des raisons pratiques et basés sur les résultats obtenus après le mélange; ils n'ont pas fait l'objet d'évaluations cliniques. Pour des raisons pratiques, les mesures domestiques sont fournies lorsqu'une dilution précise n'est pas nécessaire. Au besoin, consulter les renseignements sur les mesures des produits en poudre de Mead Johnson Nutrition. Les préparations liquides concentrées non diluées fournissent 1,35 kcal/mL.

Pour chaque bébé, la densité calorique et la nature des suppléments qu'on ajoute à la préparation pour nourrisson ou au lait maternel sont laissées au jugement clinique du diététiste ou du médecin qui connait le mieux les antécédents médicaux du bébé et ses besoins nutritionnels. Il faut tenir compte de la composition nutritionnelle et de l'osmolalité avant de choisir un supplément. Introduire les changements graduellement pour réduire le risque d'intolérance.

Point de départ : 59 mL de préparation ou de lait maternel à 20 kcal/30 mL

Choisir un supplément :

Objectif	Préparation en poudre*	Préparation liquide concentrée
22 kcal/30 mL	0,9 g	7 mL (~ 1½ c. à thé)
24 kcal/30 mL	1,8 g	15 mL (~ 1 c. à soupe)
27 kcal/30 mL	3,2 g	32 mL (~ 2 c. à soupe)

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Point de départ : 59 mL de préparation à 22 kcal/30 mL

Choisir un supplément :

Objectif	Eau	Préparation en poudre*	Préparation liquide concentrée
20 kcal/30 mL	6 mL (~ 1 c. à thé)	—	—
24 kcal/30 mL	—	0,9 g	7 mL (~ 1½ c. à thé)
27 kcal/30 mL	—	2,3 g	23 mL (~ 1 c. à soupe + 1½ c. à thé)
30 kcal/30 mL	—	3,8 g	47 mL (~ 3 c. à soupe)

Point de départ : 59 mL de préparation ou de lait maternel fortifié à 24 kcal/30 mL

Choisir un supplément :

Objectif	Eau	Préparation en poudre*	Préparation liquide concentrée
20 kcal/30 mL	12 mL (~ 2½ c. à thé)	—	—
22 kcal/30 mL	5,5 mL (1 c. à thé)	—	—
27 kcal/30 mL	—	1,4 g	14 mL (~ 1 c. à soupe)
30 kcal/30 mL	—	2,8 g	35 mL (~ 2 c. à soupe + 1 c. à thé)

***Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.[1]**

1. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA. International Formula Council; 2004:4.

Profil acides aminés

Composition en acide aminés des préparations pour nourrissons

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine
Enfamil A+® mg/100 kcal mg/100 g*	 50 250	 116 590	 210 1080	 180 910	 46 230
Enfamil A+ Gentlease® mg/100 kcal mg/100 g	 58 290	 133 680	 250 1250	 210 1050	 53 270
Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment mg/100 kcal mg/100 g	 73 360	 130 640	 250 1250	 210 1040	 63 310
Enfamil A+® EnfaCare® mg/100 kcal mg/100 g*	 70 350	 162 800	 300 1480	 250 1240	 64 320
Enfamil A+® Soya mg/100 kcal mg/100 g*	 68 340	 123 620	 210 1040	 158 800	 65 330
Pregestimil® A+® mg/100 kcal mg/100 g*	 84 420	 162 810	 270 1370	 240 1180	 73 360
Nutramigen® A+® avec LGG® mg/100 kcal mg/100 g*	 84 420	 162 810	 270 1360	 240 1170	 73 360
Nutramigen® A+® mg/100 kcal mg/100 g*	 84 420	 162 810	 270 1360	 240 1170	 73 360
PURAMINO A+® mg/100 kcal mg/100 g	 73 360	 190 950	 340 1710	 220 1110	 64 320

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Décembre 2018 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine
PURAMINO A+® JUNIOR					
mg/100 kcal	73	190	340	220	64
mg/100 g	360	950	1720	1120	320
Enfamil A+® 2					
mg/100 kcal	75	135	260	220	65
mg/100 g*	370	670	1300	1080	320
Enfagrow A+®					
mg/100 kcal	116	210	400	340	100
mg/100 g*	520	930	1800	1500	450

Produit	Cystéine	Phénylalanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
Enfamil A+®						
mg/100 kcal	36	84	80	122	35	122
mg/100 g*	184	420	400	620	177	620
Enfamil A+ Gentlease®						
mg/100 kcal	42	97	92	140	40	140
mg/100 g	210	490	470	710	200	710
Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment						
mg/100 kcal	23	125	125	115	35	158
mg/100 g	112	620	620	570	175	780
Enfamil A+® EnfaCare®						
mg/100 kcal	51	118	112	171	49	171
mg/100 g*	250	580	550	840	240	840
Enfamil A+® Soya						
mg/100 kcal	28	133	98	93	33	128
mg/100 g*	140	670	500	470	165	650
Pregestimil® A+®						
mg/100 kcal	48	137	59	129	46	200
mg/100 g*	240	690	290	640	230	1010
Nutramigen® A+® avec LGG®						
mg/100 kcal	48	137	59	129	46	200
mg/100 g*	240	680	290	640	230	1000

Produit	Cystéine	Phénylalanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
Nutramigen® A+®						
mg/100 kcal	48	137	59	129	46	200
mg/100 g*	240	680	290	640	230	1000
PURAMINO A+®						
mg/100 kcal	73	140	151	171	67	210
mg/100 g	360	700	750	850	330	1060
PURAMINO A+® JUNIOR						
mg/100 kcal	73	140	151	171	67	210
mg/100 g	360	700	750	850	340	1060
Enfamil A+® 2						
mg/100 kcal	23	130	130	120	37	164
mg/100 g*	116	650	650	590	182	810
Enfagrow A+®						
mg/100 kcal	36	200	200	184	56	250
mg/100 g*	160	890	890	820	250	1120

*En poudre seulement.

ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS

Produit	Arginine	Alanine	Acide aspartique	Acide glutamique
Enfamil A+® mg/100 kcal mg/100 g*	60 300	88 440	200 990	400 2000
Enfamil A+ Gentlease® mg/100 kcal mg/100 g	69 350	101 510	230 1150	460 2300
Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment mg/100 kcal mg/100 g	88 430	85 420	200 990	550 2700
Enfamil A+® EnfaCare® mg/100 kcal mg/100 g*	84 410	123 610	270 1350	560 2800
Enfamil A+® Soya mg/100 kcal mg/100 g*	200 1020	108 550	290 1490	470 2400
Pregestimil® A+® mg/100 kcal mg/100 g*	112 560	95 480	210 1060	640 3200
Nutramigen® A+® avec LGG® mg/100 kcal mg/100 g*	112 560	95 470	210 1060	640 3200
Nutramigen® A+® mg/100 kcal mg/100 g*	112 560	95 470	210 1060	640 3200
PURAMINO A+® mg/100 kcal mg/100 g	148 740	270 1350	560 2800	168 830
PURAMINO A+® JUNIOR mg/100 kcal mg/100 g	148 740	270 1360	560 2800	168 840
Enfamil A+® 2 mg/100 kcal mg/100 g*	91 450	88 440	210 1030	570 2800
Enfagrow A+® mg/100 kcal mg/100 g*	140 620	136 610	320 1420	880 3900

*En poudre seulement.

Produit	Glycine	Proline	Sérine
Enfamil A+® mg/100 kcal mg/100 g*	 40 200	 160 810	 114 580
Enfamil A+ Gentlease® mg/100 kcal mg/100 g	 46 230	 184 940	 131 670
Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment mg/100 kcal mg/100 g	 50 250	 250 1230	 145 720
Enfamil A+® EnfaCare® mg/100 kcal mg/100 g*	 56 280	 220 1100	 160 790
Enfamil A+® Soya mg/100 kcal mg/100 g*	 105 530	 135 690	 128 650
Pregestimil® A+® mg/100 kcal mg/100 g*	 59 290	 290 1470	 162 810
Nutramigen® A+® avec LGG® mg/100 kcal mg/100 g*	 59 290	 290 1460	 162 810
Nutramigen® A+® mg/100 kcal mg/100 g*	 59 290	 290 1460	 162 810
PURAMINO A+® mg/100 kcal mg/100 g	 73 360	 280 1390	 171 850
PURAMINO A+® JUNIOR mg/100 kcal mg/100 g	 73 360	 280 1400	 171 850
Enfamil A+® 2 mg/100 kcal mg/100 g*	 52 260	 260 1280	 151 750
Enfagrow A+® mg/100 kcal mg/100 g*	 80 360z	 400 1760	 230 1030

*En poudre seulement

†Les valeurs de la préparation concentrée varient légèrement.

Composition en acides aminés des préparations pour troubles du métabolisme

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine
BCAD 1					
mg/100 kcal	109	0	0	350	93
mg/100 g	550	0	0	1770	470
BCAD 2					
mg/100 kcal	220	0	0	700	189
mg/100 g	890	0	0	2900	770
PFD 1					
mg/100 kcal	0	0	0	0	0
mg/100 g	0	0	0	0	0
PFD 2					
mg/100 kcal	0	0	0	0	0
mg/100 g	0	0	0	0	0
Phenyl-Free® 1					
mg/100 kcal	80	230	420	260	70
mg/100 g	410	1150	2100	1300	360
Phenyl-Free® 2					
mg/100 kcal	135	380	700	430	119
mg/100 g	550	1560	2900	1760	480
Phenyl-Free® 2 HP					
mg/100 kcal	260	720	1330	820	220
mg/100 g	1000	2800	5200	3200	880
TYROS 1					
mg/100 kcal	83	240	440	270	73
mg/100 g	420	1200	2200	1370	370
TYROS 2					
mg/100 kcal	135	390	710	440	119
mg/100 g	550	1580	2900	1800	480

Produit	Cystéine	Phényl-alanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
BCAD 1						
mg/100 kcal	67	182	182	150	80	0
mg/100 g	340	920	920	760	410	0
BCAD 2						
mg/100 kcal	136	370	370	300	159	0
mg/100 g	550	1490	1490	1220	650	0
PFD 1						
mg/100 kcal	0	0	0	0	0	0
mg/100 g	0	0	0	0	0	0
PFD 2						
mg/100 kcal	0	0	0	0	0	0
mg/100 g	0	0	0	0	0	0
Phenyl-Free® 1						
mg/100 kcal	48	0	320	147	58	250
mg/100 g	240	0	1600	750	290	1250
Phenyl-Free® 2						
mg/100 kcal	81	0	530	250	97	420
mg/100 g	330	0	2200	1010	400	1690
Phenyl-Free® 2 HP						
mg/100 kcal	153	0	1010	470	184	790
mg/100 g	600	0	4000	1840	720	3100
TYROS 1						
mg/100 kcal	53	0	0	155	63	260
mg/100 g	270	0	0	780	320	1320
TYROS 2						
mg/100 kcal	86	0	0	250	103	430
mg/100 g	350	0	0	1030	420	1740

ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS

Produit	Arginine	Alanine	Acide aspartique	Acide glutamique
BCAD 1				
mg/100 kcal	230	250	310	610
mg/100 g	1180	1280	1560	3100
BCAD 2				
mg/100 kcal	420	460	550	1100
mg/100 g	1730	1870	2300	4500
PFD 1				
mg/100 kcal	0	0	0	0
mg/100 g	0	0	0	0
PFD 2				
mg/100 kcal	0	0	0	0
mg/100 g	0	0	0	0
Phenyl-Free® 1				
mg/100 kcal	192	210	250	510
mg/100 g	970	1070	1280	2600
Phenyl-Free® 2				
mg/100 kcal	320	360	430	850
mg/100 g	1320	1450	1740	3500
Phenyl-Free® 2 HP				
mg/100 kcal	610	670	810	1610
mg/100 g	2400	2600	3200	6300
TYROS 1				
mg/100 kcal	220	240	290	570
mg/100 g	1100	1200	1450	2900
TYROS 2				
mg/100 kcal	360	390	470	930
mg/100 g	1450	1580	1910	3800

Produit	Glycine	Proline	Sérine
BCAD 1 mg/100 kcal mg/100 g	 141 710	 310 1560	 154 780
BCAD 2 mg/100 kcal mg/100 g	 250 1030	 550 2300	 280 1130
PFD 1 mg/100 kcal mg/100 g	 0 0	 0 0	 0 0
PFD 2 mg/100 kcal mg/100 g	 0 0	 0 0	 0 0
Phenyl-Free® 1 mg/100 kcal mg/100 g	 115 580	 250 1280	 125 630
Phenyl-Free® 2 mg/100 kcal mg/100 g	 194 790	 430 1740	 210 860
Phenyl-Free® 2 HP mg/100 kcal mg/100 g	 370 1440	 810 3200	 400 1560
TYROS 1 mg/100 kcal mg/100 g	 129 650	 290 1450	 142 720
TYROS 2 mg/100 kcal mg/100 g	 210 860	 470 1910	 230 950

Composition en acides aminés pour la préparation Portagen®

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine
mg/100 kcal	104	184	350	290	101
mg/100 mL	490	870	1630	1380	480

Produit	Cystéine	Phényl-alanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
mg/100 kcal	15,5	191	210	158	56	240
mg/100 mL	73	900	990	750	270	1120

ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS

Produit	Arginine	Alanine	Acide aspartique	Acide glutamique
mg/100 kcal	133	115	260	830
mg/100 mL	630	540	1240	3900

Produit	Glycine	Proline	Sérine
mg/100 kcal	68	390	210
mg/100 mL	320	1850	1000

Composition en acides aminés pour les préparations pour nourrissons prématurés

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine
Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal (59 mL)					
mg/100 kcal	75	174	320	270	69
mg/100 mL	50	116	210	180	46
Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal (59 mL)					
mg/100 kcal	75	174	320	270	69
mg/100 mL	60	139	260	220	55
Enfamil® A+® pour prématurés hyper protéinée (59 mL)					
mg/100 kcal	88	200	370	320	81
mg/100 mL	70	162	300	250	64
Fortifiant de lait maternel Enfamil®					
mg/100 kcal	200	470	870	730	186
mg/100 g	1000	2300	4300	3600	920
Enfamil A+® EnfaCare® (59 mL)					
mg/100 kcal	70	162	300	250	64
mg/100 mL	53	122	220	189	48

Produit	Cystéine	Phényl-alanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal (59 mL)						
mg/100 kcal	55	126	120	183	53	183
mg/100 mL	36	84	80	122	35	122
Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal (59 mL)						
mg/100 kcal	55	126	120	183	53	183
mg/100 mL	44	101	96	146	42	146
Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée (59 mL)						
mg/100 kcal	64	147	140	210	61	210
mg/100 mL	51	118	112	171	49	171
Fortifiant de lait maternel Enfamil®						
mg/100 kcal	147	340	320	490	142	490
mg/100 g	730	1680	1600	2400	700	2400
Enfamil A+® EnfaCare® (59 mL)						
mg/100 kcal	51	118	112	171	49	171
mg/100 mL	38	88	84	128	37	128

ACIDES AMINÉS NON ESSENTIELS

Produit	Arginine	Alanine	Acide aspartique	Acide glutamique
Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal (59 mL)				
mg/100 kcal	90	132	290	600
mg/100 mL	60	88	200	400
Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal (59 mL)				
mg/100 kcal	90	132	290	600
mg/100 mL	72	106	240	480
Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée (59 mL)				
mg/100 kcal	105	154	340	700
mg/100 mL	84	123	270	560
Fortifiant de lait maternel Enfamil®				
mg/100 kcal	240	360	790	1620
mg/100 g	1200	1760	3900	8000
Enfamil A+® EnfaCare® (59 mL)				
mg/100 kcal	84	123	270	560
mg/100 mL	63	92	210	420

Produit	Glycine	Proline	Sérine
Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal (59 mL)			
mg/100 kcal	60	240	171
mg/100 mL	40	160	114
Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal (59 mL)			
mg/100 kcal	60	240	171
mg/100 mL	48	192	137
Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée (59 mL)			
mg/100 kcal	70	280	200
mg/100 mL	56	220	160
Fortifiant de lait maternel Enfamil®			
mg/100 kcal	162	650	460
mg/100 g	800	3200	2300
Enfamil A+® EnfaCare® (59 mL)			
mg/100 kcal	56	220	160
mg/100 mL	42	168	120

Indications Casher

Les produits suivants de Mead Johnson Nutrition sont fabriqués sous la surveillance de la Division de Kashruth de l'union des rassemblements juifs orthodoxes de l'Amérique.

Produit	
Eau Enfamil®	O.U. Parève*
Eau Glucosée à 5% Enfamil®	O.U. Parève*
Enfagrow A+®	O.U.D.
Enfamil A+®	O.U.D.
Enfamil A+® Pour l'alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment†	O.U.D.
Enfamil A+®	O.U.D.
Enfamil A+® Hypercalorique	O.U.D.
Enfamil A+® Sans lactose	O.U.D.
Enfamil A+® Soya	O.U. Pareve*
Enfamil A+ Gentlease®	O.U.D.
Enfamil®	O.U.D.
Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal	O.U.D.
Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal	O.U.D.
Enfamil A+® pour prématurés hyper protéinée	O.U.D.
Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide)	O.U.
Enfamil A+® EnfaCare®	O.U.D.
PURAMINO A+®	O.U.D.
PURAMINO A+® JUNIOR	O.U.D.
Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide)	O.U.
Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop)	O.U.
Enfamil® Plus faible en fer que les autres préparations Enfamil®	O.U.D.
Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide)	O.U.

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984
Mise à jour : Juillet 2018 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Produit	
Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquid)	O.U.
Enfamil® 2	O.U.D.
Enfamil A+® 2	O.U. D.
Fortifiant de lait maternel Enfamil®	O.U.D.
Solution Orale Enfamil® Enfalyte®	O.U. Parève*
Portagen®	O.U.D.

*Ingrédients parèves; installations laitières utilisées.
†Pour les bébés qui régurgitent plus de 4 fois par jour.

Instructions destinées au milieu hospitalier

POUR BIEN PRÉPARER, CONSERVER ET UTILISER LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. «Pour réduire le plus possible les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[1]. »

Instructions concernant la préparation et l'utilisation[1,2]

- Suivre rigoureusement la procédure de l'hôpital
- S'assurer qu'il s'agit du produit prescrit (s'assurer d'avoir le bon produit et en confirmer la dilution)
- Lavez et séchez vos mains. Nettoyez soigneusement la surface de travail avec une solution désinfectante antibactérienne qui convient aux surfaces entrant en contact avec des aliments.
- S'assurer que le contenant n'est pas endommagé
- Utiliser seulement des contenants et des instruments de mesure stérilisés
- Éviter la contamination par contact à chaque étape de la préparation
- Inspecter visuellement la préparation (si une quelconque anomalie est détectée, mettre la préparation de côté et contacter le représentant Mead Johnson)
- Utiliser de préférence une eau stérilisée froide pour reconstituer les préparations sous forme de liquide concentré ou de poudre
- Ne pas utiliser un mélangeur pour reconstituer les préparations en poudre
- Ne pas conserver dans un chauffe-biberon ni utiliser de four à micro-ondes pour réchauffer la préparation

Instructions concernant la conservation des préparations apprêtées

Recommandations

Réfrigération

- Conserver de préférence dans des réfrigérateurs réservés à cet usage
- Conserver entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Température ambiante

- La préparation doit être offerte immédiatement ou utilisée dans les 2 heures suivant sa reconstitution.
- Si la préparation a été réchauffée, la jeter après une heure

Après le début de la tétée

- Ne pas conserver pendant plus de une heure
- Ne pas réfrigérer pour utilisation ultérieure

Durée d'administration de l'alimentation par sonde*† en fonction du type de préparation	Nouveaux-nés ou nourrissons/enfants immunodéprimés	Nourrissons et enfants ayant un système immunitaire sain
Préparation prête à employer (commercialement stérile)	4 h	8 h
Préparations liquides concentrées (commercialement stériles) Préparations en poudre (non stériles)	4 h	4 h
Poudre ajoutée à une préparation liquide ou au lait maternel[3]	4 h	4 h
Liquide (commercialement stérile) ajouté au lait maternel	4 h	4 h

L'absence de conformité à ces instructions pourrait entraîner de graves conséquences pour les nourrissons.

*D'après Robbins et Meyers, p.100[2].

†Pour les directives sur les changements de réservoir et de sonde, consulter la publication de l'American Dietetic Association, Guidelines for Preparation of Formula and Breastmilk in Health Care Facilities. American Dietetic Association, 2004.

1. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4. 2. Robbins ST, Meyers R, eds. *Infant Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities.* Chicago, Ill: American Dietetic Association; 2011. 3. Telang S, Berseth CL, Ferguson PW, *et al.* Fortifying fresh human milk with commercial powdered human milk fortifiers does not affect bacterial growth during 6 hours at room temperature. *J Am Diet Assoc.* 2005;105:1567-1572.

L'American Dietetic Association a été renommée Academy of Nutrition and Dietetics

Renseignements nutritionnels divers

Calcus et conversions

Apports nutritionnels de référence (ANREF) - Conversion des unités

Acide folique	1 EFA = 1 µg d'acide folique de source alimentaire
Niacine	1 NE = 1 équivalent nutritionel = 1 mg de niacine 1 équivalent nutritionnel = 60 mg de Tryptophanee
Vitamine A	1 équivalent d'activité rétinol = 1 µg de rétinol = 3,33 UI de rétinol Pour la vitamine A préformée, 1 équivalent rétinol = 1 équivalent d'activité rétinol
Vitamine D	1 µg = 40 UI
Vitamine E	1 UI de vitamine E naturelle ou synthétique = 0,67 mg d'équivalent alpha-tocophérol 1 UI de vitamine E synthétique et esters = 0,45 mg d'alpha-tocophérol 1 UI de vitamine E naturelle et esters = 0,67 mg d'alpha-tocophérol

Centre de renseignements aux hôpitaux : 1 800 263-1143
Bureau des commandes : 1 877 307-2984

Mise à jour : Juin 2016 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2018 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Centre de renseignements aux professionnels de la santé

enfamil.ca/medical

Votre partenaire dans le domaine de l'alimentation pédiatrique
Le Centre de renseignements aux professionnels de la santé de Mead Johnson Nutrition offre de l'information, des outils de soutien et de l'éducation aux professionnels de la santé.

Mead Johnson Nutrition

professionnels de la santé
centre de renseignement
"Votre partenaire en nutrition pédiatrique"

©2018 Mead Johnson & Company, LLC